

Teichmüllerraum für total degenerierte Kurven

Dissertation
zur Erlangung des Doktorgrades
der Fakultät für Mathematik
der Ruhr-Universität Bochum

vorgelegt von
Bernd Brinkmann
aus Menden

Bochum 1989





Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41543113_0003

Teichmüllerraum für total degenerierte Kurven

Dissertation
zur Erlangung des Doktorgrades
der Fakultät für Mathematik
der Ruhr-Universität Bochum

vorgelegt von
Bernd Brinkmann
aus Menden

Bochum 1989

1. Gutachter: Prof. Dr. L. Gerritzen

2. Gutachter: Prof. Dr. H. Zieschang

Tag der mündlichen Prüfung: 4.7.1989

Inhaltsverzeichnis

§1	Einleitung	3
	Vorwort	3
	$\mathcal{A}$ Verallgemeinerte Schottky-Überlagerung	5
	$\mathcal{B}$ Der erweiterte Schottkyraum $\bar{S}_g$	8
	$\mathcal{C}$ B_n	13
§2	T_g^d	15
§3	Der Durchschnitt zweier Komponenten	28
§4	Der Komplex von Culler-Vogtmann	37
§5	Spezialfall $g=2$ und $g=3$	43
	$\mathcal{A}$ $g=2$	43
	$\mathcal{B}$ $g=3$	45
§6	Anhang	50
	Literatur	67

§1 Einleitung

Vorwort

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Teichmüllerraum T_g^d ($g \geq 2$) für total degenerierte Kurven, d.h., für projektive Kurven, bei denen jede Komponente isomorph zu P_1 und jeder singuläre Punkt ein gewöhnlicher Doppelpunkt ist. Die Punkte von T_g^d entsprechen total degenerierten Kurven zusammen mit einer Auswahl einer Basis der Fundamentalgruppe, welche isomorph zu F_g , der freien Gruppe vom Rang g , ist. Das Hauptergebnis ist, daß T_g^d einfach zusammenhängend ist. Auf T_g^d operiert die äußere Automorphismengruppe von F_g . Der Quotient ist Modulraum für total degenerierte Kurven. Als Korollar erhält man, daß auch dieser Modulraum einfach zusammenhängend ist. Zur Konstruktion von T_g^d geht man vom gewöhnlichen Schottkyraum S_g aus. S_g parametrisiert kompakte Riemannsche Flächen X vom Geschlecht g mit einer Zusatzstruktur. Für diese Zusatzstruktur benötigt man eine Schottky-Überlagerung $\tilde{X}$ von X . Die Decktransformationsgruppe $\text{Deck}(\tilde{X}|X)$ ist isomorph zu F_g . Die Zusatzstruktur ist dann gegeben durch die Schottky-Überlagerung zusammen mit einer Auswahl einer Basis der Decktransformationsgruppe. S_g wird durch Hinzunahme von Punkten, die singulären Kurven entsprechen, in einen Raum $\tilde{S}_g$ eingebettet (siehe [GH]). Als "äußersten" Rand in $\tilde{S}_g$ hat man den Raum T_g^d . Die Schottky-Überlagerung ist hier stets die universelle Überlagerung, d.h., die Zusatzstruktur auf diesen Kurven besteht nur noch in der Auswahl einer Basis der Fundamentalgruppe. Der Raum T_g^d läßt sich auch ohne den Umweg über $\tilde{S}_g$ direkt konstruieren (siehe [P]). Diese Begriffe werden im ersten Paragraphen erläutert.

Im zweiten Paragraphen wird dann der Raum T_g^d genauer untersucht. Es stellt sich heraus, daß er aus unendlich vielen, zueinander isomorphen, glatten Komponenten der Dimension $2g - 3$ besteht. Über $\tilde{S}_g$ hat man eine universelle Familie von Kurven mit Schottky-Struktur, d.h., über T_g^d hat man die universelle Familie von degenerierten Kurven zusammen mit ihrer universellen Überlagerung und der Aktion von F_g auf dieser. Die Eigenschaft eines Punktes in T_g^d , zu einer bestimmten Komponente zu gehören, läßt sich durch eine Eigenschaft der Aktion der freien Gruppe auf der universellen Überlagerung ausdrücken.

Mit Hilfe dieser Charakterisierung wird im dritten Paragraphen der Durchschnitt zweier Komponenten berechnet. Es zeigt sich, daß dieser Durchschnitt glatt und einfach zusammenhängend ist. Außerdem wird ein leicht zu prüfendes Kriterium angegeben, mit dem sich entscheiden läßt, ob zwei Komponenten sich schneiden.

Im vierten Paragraphen wird der Zusammenhang zum Komplex von Culler-Vogtmann (siehe [CV]) hergestellt. Diese betrachten metrisierte Graphen vom Geschlecht g zusammen mit einer Auswahl einer Basis der Fundamentalgruppe, welche ebenfalls isomorph zu F_g ist. Der Raum K_g , der diese Objekte parametrisiert, ist ein Komplex, der durch offene Teile überdeckt werden kann, die den Komponenten von T_g^d entsprechen und das gleiche Schnittverhalten haben. Aus der Tatsache, daß K_g einfach zusammenhängend ist, läßt sich folgern, daß T_g^d ebenfalls einfach zusammenhängend ist.

In einem fünften Paragraphen wird der Raum T_g^d für $g = 2, 3$ genauer untersucht. Insbesondere wird berechnet, welche Komponenten sich schneiden. In einem Anhang wird das Schnittverhalten für $g = 3$ in Tabellen aufgelistet.

A Verallgemeinerte Schottky-Überlagerungen

In diesem Paragraphen sollen zunächst die für diese Arbeit wesentlichen Ergebnisse aus [GH] ohne Beweis angeführt werden. Es soll ein feiner Modulraum $\bar{S}_g$ für stabile Riemannsche Flächen mit Schottky-Struktur konstruiert werden.

Def.1: Sei X eine orientierbare, kompakte, zusammenhängende Kurve über $\mathbb{C}$.

a) X heißt *stabil*, wenn gilt:

- (i) Jede Singularität von X ist ein gewöhnlicher Doppelpunkt.
- (ii) Für jede Komponente L von X gilt:
 L schneidet mindestens $3 - 2g(L)$ andere Komponenten.

b) Der Schnittgraph G_X einer Kurve X ist gegeben durch:

Die Knoten von G_X entsprechen den Komponenten von X . Für jeden Punkt in $Sing(X)$ erhält man eine Kante:

Liegt der Punkt auf zwei Komponenten, so verbindet man die entsprechenden Knoten. Liegt der Punkt nur auf einer Komponente, so erhält man eine Schleife an dem entsprechenden Knoten.

c) Sei

$$X = \bigcup_{i=1}^r L_i$$

L_i die Komponenten von X .

Setze

$$g(X) = \sum_{i=1}^r g(L_i) + g(G_X)$$

Um nun eine Schottky-Struktur auf X zu erklären, soll die Fläche in $g(X)$ Jordankurven aufgeschnitten werden.

Def.2: Ein *Schnittsystem* $c=(c_1, \dots, c_g)$ ist ein g -Tupel von Wegen c_i mit:

- (i) c_i ist einfach geschlossener Jordanweg, der keine Singularität trifft, oder ein konstanter Weg in einer Singularität.
- (ii) $c_i \cap c_j = \emptyset$ ($i \neq j$)

- (iii) $X \setminus \bigcup \text{Spur}(c_i) =: X \setminus c$ ist zusammenhängend.
- (iv) Der Schnittgraph von $X \setminus c$ ist ein Baum.
- (v) Alle Komponenten von $X \setminus c$ haben Geschlecht 0.

Damit läßt sich erklären, was eine Schottky-Überlagerung relativ zu c ist.

Def.3: $\tilde{X} \xrightarrow{p} X$ sei eine unverzweigte Überlagerung.

a) p heißt *normal*, wenn das Bild von

$$\pi_1(p) : \pi_1(\tilde{X}, a) \rightarrow \pi_1(X, p(a))$$

ein Normalteiler ist. Für die Decktransformationsgruppe $D(\tilde{X}|X)$ gilt dann:

$$D(\tilde{X}|X) \cong \pi_1(X, p(a)) / \pi_1(p)[\pi_1(\tilde{X}, a)] \quad ,$$

d.h., man hat einen surjektiven Homomorphismus

$$\pi_1(X, p(a)) \rightarrow D(\tilde{X}|X) \quad .$$

b) $\tilde{X} \xrightarrow{p} X$ heißt *Schottky-Überlagerung* relativ zu c , wenn gilt:

- (i) Die Zusammenhangskomponenten von $p^{-1}(X \setminus c)$ sind vermöge p homöomorph zu $X \setminus c$.
- (ii) Ist $\tilde{Y} \xrightarrow{q} X$ eine Überlagerung von X und sind die Zusammenhangskomponenten von $q^{-1}(X \setminus c)$ vermöge q homöomorph zu $X \setminus c$, so gibt es eine stetige Abbildung $f : \tilde{X} \rightarrow \tilde{Y}$, so daß $q \circ f = p$.

Lemma1: Zu jeder orientierbaren, stabilen Fläche X vom Geschlecht g und jedem Schnittsystem c auf X gibt es eine eindeutig bestimmte Schottky-Überlagerung $\tilde{X}$ relativ zu c .

Es ist $D(\tilde{X}|X) \cong F_g$, wobei F_g die freie Gruppe vom Rang g ist.

Bew.: [GH], Seite 192–193

Um einen feinen Modulraum betrachten zu können, werden nun Familien von Kurven erklärt.

Def.4: Sei $\pi : X \rightarrow U$ eine stetige, surjektive, offene Abbildung.

a) π heißt *Familie von stabilen Kurven*, wenn gilt:

- (i) für jedes $x \in X$ gibt es eine Umgebung V von x , so daß gilt:
 $V \xrightarrow{\pi} \pi(V)$ ist homöomorph zur Projektion

$$\pi(V) \times D \rightarrow \pi(V) \quad ,$$

wo D offener Einheitskreis in $\mathbb{C}$,

oder:

$V \xrightarrow{\pi} \pi(V)$ ist homöomorph zur Projektion

$$\{(z, w, t) \in C^3 \times \pi(V) : z \cdot w = f(t)\} \rightarrow \pi(V) \quad ,$$

wo f eine stetige, surjektive Funktion von $\pi(V)$ nach $\mathbb{C}$ ist.

- (ii) $X_u = \pi^{-1}(u)$ ist stabile Kurve für jedes $u \in U$.

b) Ein Weg c in $X|U$ ist eine stetige Abbildung

$$c : U \times I \rightarrow X, \text{ mit } c(u, t) \in X_u \quad \forall u \in U, t \in I = [0, 1]$$

Ein Schnittsystem $c = (c_1, \dots, c_g)$ für eine Familie von stabilen Kurven ist ein g -Tupel von Wegen c_i , so daß $c_u = (c_{1,u}, \dots, c_{g,u})$ ein Schnittsystem für X_u ist.

- c) Ist $\tilde{X} \xrightarrow{\tilde{\pi}} U$ eine weitere Familie über U , so heißt eine stetige Abbildung $f : \tilde{X} \rightarrow X$ unverzweigt, falls $\pi \circ f = \tilde{\pi}$ ist und es zu jedem Punkt $x \in X$ eine offene Umgebung V von x gibt, so daß die Zusammenhangskomponenten von $f^{-1}(V)$ vermöge f homöomorph zu V sind.
 Für jeden Punkt $u \in U$ ist dann die Abbildung $\tilde{\pi}_u : \tilde{X}_u \rightarrow X_u$ eine unverzweigte Überlagerung.

d) $\tilde{X} \xrightarrow{\tilde{\pi}} X$ heißt normal, wenn jedes π_u normal ist.

Es gilt nun analog zu Lemma 1:

Lemma2: Sei $X|U$ eine Familie von stabilen Flächen vom Geschlecht g , $c = (c_1, \dots, c_g)$ ein Schnittsystem, dann gibt es eine Familie $\tilde{X}|U$ und eine



normale Überlagerung $\tilde{X} \xrightarrow{f} X$, so daß für jedes $u \in U$ die induzierte Überlagerung $\tilde{X}_u \rightarrow X_u$ eine Schottky-Überlagerung relativ zum Schnittsystem c_u auf X_u ist. $\tilde{X}|U$ und f sind eindeutig bestimmt, und $D(\tilde{X}|X) \cong F_g$.

Bew.: [GH], Seite 193–194.

Def.5:

- a) Eine Überlagerung $\tilde{X}|U \xrightarrow{f} X|U$ heißt *Schottky-Überlagerung*, wenn es für jeden Punkt $u \in U$ eine offene Umgebung V von u und ein Schnittsystem c für $X|V$ gibt, so daß $\tilde{X}|V \rightarrow X|V$ die Schottky-Überlagerung von $X|V$ relativ zu c ist.
- b) Sei $X|U$ eine Familie von stabilen Kurven vom Geschlecht $g \geq 2$. Eine *Schottky-Struktur* auf $X|U$ ist eine Schottky-Überlagerung $\tilde{X}|U \rightarrow X|U$ und ein Isomorphismus

$$\sigma : D(\tilde{X}|X) \rightarrow F_g \quad ,$$

wobei $\sigma \approx \sigma'$, falls sie sich um einen inneren Automorphismus von F_g unterscheiden.

Als nächstes wird nun ein feiner Modulraum für Familien von Kurven mit Schottky-Struktur konstruiert.

$\mathcal{B}$ Der erweiterte Schottkyraum $\bar{S}_g$

Wie für den gewöhnlichen Schottkyraum nimmt man die Fixpunkte und Multiplikatoren der Basiselemente als Koordinaten. Die Aktion von PGL_2 berücksichtigt man, nicht indem man drei Fixpunkte normiert, sondern indem man die Doppelverhältnisse der Fixpunkte betrachtet. Um von der Wahl einer speziellen Basis unabhängig zu sein, betrachtet man die Doppelverhältnisse aller anziehenden Fixpunkte aller primitiven Elemente der Schottkygruppe, um Koordinaten zu bekommen. Man wird sehen, daß lokal immer endlich viele Koordinaten ausreichen, im Gegensatz zu S_g global aber unendlich viele gebraucht werden. Da der abstoßende Fixpunkt einer Transformation der anziehende Fixpunkt der inversen Transformation ist und der Multiplikator eines Elementes γ das Doppelverhältnis der

Fixpunkte von $\gamma, \gamma^{-1}, \gamma', \gamma\gamma'\gamma^{-1}$ für beliebiges γ' ist, reichen diese Doppelverhältnisse als Koordinaten aus.

In S_g sind die Doppelverhältnisse von Fixpunkten immer ungleich $0, 1, \infty$. Die Degeneration liegt darin, daß Doppelverhältnisse auch diese Werte annehmen können. Die Fixpunkte liegen dann nicht auf der gleichen Komponente der Kurve. Im folgenden soll nun die Konstruktion von $\bar{S}_g$, wie sie in [GH], Seite 194–198 beschrieben ist, kurz erläutert werden.

Sei

$$I = \{\gamma \in F_g : \gamma \neq id, \gamma \neq (\gamma')^n \forall \gamma' \in F_g, n > 1\}$$

die Menge der primitiven Elemente in F_g .

Sei $V \subset I^4$ die Menge aller Viertupel mit paarweise verschiedenen Einträgen. F_g operiert auf V durch Konjugation.

Def.6: B_I sei der abgeschlossene Unterraum von P_1^V , gegeben durch folgende inhomogen geschriebene Gleichungen:

- (i) $\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4} = (\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_4, \gamma_3})^{-1}$
- (ii) $\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4} = 1 - \lambda_{\gamma_2, \gamma_3, \gamma_4, \gamma_1}$
- (iii) $\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4} \cdot \lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_4, \gamma_5} = \lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_5}$

für alle $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4, \gamma_5 \in F_g$, dabei ist

$$\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4} = \frac{a_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4}}{b_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4}} \quad \text{Koordinatenfunktion.}$$

Bem.1: Diese Gleichungen beschreiben die Relationen, die Doppelverhältnisse erfüllen. In S_g läßt sich mit der Gleichung (iii) aus den Werten für eine Basis von F_g jede andere Koordinate errechnen. Falls jedoch Koordinaten 0 sind, ist dies nicht mehr möglich.

Die Aktion von F_g auf V induziert eine Aktion auf P_1^V , gegeben durch:

$$\gamma((a_\nu)_{\nu \in V}) = (a_{\gamma\nu\gamma^{-1}})_{\nu \in V} \quad ,$$

wobei die Konjugation des Viertupels die Konjugation der einzelnen Elemente bedeutet. B_I ist invariant unter dieser Aktion. Sei $B_I^{F_g}$ die Menge

der Punkte, die unter allen Elementen von F_g invariant sind, d.h., die die zusätzlichen Gleichungen:

$$(iv) \lambda_{\gamma\nu\gamma^{-1}} = \lambda_\nu \quad \forall \gamma \in F_g$$

erfüllen.

Um eine Familie von Kurven über $\bar{S}_g$ konstruieren zu können, betrachtet man $I' = I \cup \{m\}$ und $B_{I'}$. F_g operiert auf I' vermöge $\gamma(m) = m$. Somit operiert F_g auch auf $B_{I'}$. Man hat eine natürliche Projektion $\pi: B_{I'} \rightarrow B_I$. Setze $B' = \pi^{-1}(B_I^{F_g})$. F_g operiert dann auf den Fasern $B'_b = \pi^{-1}(b)$, $b \in B_I^{F_g}$.

Für $\gamma \in I$ sei $B'_\gamma \subset B'$ die Menge gegeben durch die Gleichungen

$$\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, m, \gamma} = 1 \quad \forall \gamma_1, \gamma_2 \in I \setminus \{\gamma\}$$

$B'_b \cap B'_\gamma$ ist stets einpunktig, und man erhält einen bianalytischen Schnitt

$$\Phi_\gamma: B_I^{F_g} \rightarrow B'_\gamma \hookrightarrow B' \quad \text{von } \pi$$

Für $\gamma' \in I, \gamma \in F_g$ ist $\Phi_{\gamma\gamma'\gamma^{-1}} = \gamma \circ \Phi_{\gamma'}$ also insbesondere $\Phi_\gamma = \gamma \circ \Phi_\gamma$, d.h., $\Phi_\gamma(b)$ ist Fixpunkt von γ für die Aktion von F_g auf B'_b .

Es ist $B'_\gamma \cap B'_{\gamma'} = \emptyset$ für $\gamma \neq \gamma'$. $\bar{S}_g$ wird nun definiert als die Menge der Punkte in $B_I^{F_g}$, über denen die F_g -Aktion auf der Faser eine Schottky-Aktion ist.

Def.7:

a) $\bar{S}_g$ ist die Teilmenge der $b \in B_I^{F_g}$, für die gilt:

- (i) $\Phi_\gamma(b)$ ist anziehender Fixpunkt von γ für die Aktion von F_g auf B'_b .
- (ii) Für jede Komponente L von B'_b ist die Isotropiegruppe $F_{g,L}$ eine gewöhnliche Schottkygruppe.
- (iii) Für jede Komponente L von B'_b sind die Schnittpunkte mit anderen Komponenten gewöhnliche Punkte für die Aktion von $F_{g,L}$.

- b) Für jedes $b \in B'_b$ sei Ω_b das Komplement des Abschlusses der Menge $\{\Phi_\gamma(b) : \gamma \in I\}$, dann ist Ω_b eine offene F_g -invariante Teilmenge von B'_b .

$\bar{\Omega}_g \subset \pi^{-1}(\bar{S}_g)$ sei die Vereinigung aller Ω_b mit $b \in \bar{S}_g$.

Setze $\bar{C}_g = \bar{\Omega}_g / F_g$.

Es gilt der folgende Satz:

Satz1:

- a) $\bar{S}_g$ ist komplexe Mannigfaltigkeit der Dimension $3g - 3$.
 b) $\bar{C}_g \rightarrow \bar{S}_g$ ist eine flache Familie von stabilen Riemannschen Flächen vom Geschlecht g .
 c) $\bar{\Omega}_g \rightarrow \bar{C}_g$ ist Schottky-Überlagerung mit Decktransformationsgruppe F_g .
 d) $\bar{S}_g$ ist feiner Modulraum für stabile Riemannsche Flächen mit Schottky-Struktur. Die in b) und c) erklärten Abbildungen definieren die universelle Familie.

Bew.:

- a) [GH], Seite 208
 b) [GH], Seite 197
 c) [GH], Seite 197
 d) [GH], Seite 199

Bem.2: Zuletzt muß noch begründet werden, warum die $\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4}$ die Doppelverhältnisse der Fixpunkte der γ_i beschreiben. Sei also ein $b \in \bar{S}_g$ gegeben, so gilt:

$$\begin{aligned} \lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4}(b) &= \lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, m}(\Phi_{\gamma_4}(b)) \cdot \lambda_{\gamma_1, \gamma_2, m, \gamma_4}(\Phi_{\gamma_4}(b)) \\ &= \lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, m}(\Phi_{\gamma_4}(b)) \end{aligned}$$

nach Definition von Φ_{γ_4} .

Die Koordinate $\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, m}(\Phi_{\gamma_4}(b))$ beschreibt im verallgemeinerten Sinne das Doppelverhältnis der vier Fixpunkte. Man rechnet leicht nach, daß:

$$\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, m}(\Phi_{\gamma_1}(b)) = 0$$

$$\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, m}(\Phi_{\gamma_2}(b)) = \infty$$

$$\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, m}(\Phi_{\gamma_3}(b)) = 1$$

Hieraus folgt, daß $\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, m}(B'_b) = P_1$ ist, d.h., es gibt eine Komponente L mit $\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, m}(L) = P_1$. Da es nun immer eine aus endlich vielen Komponenten bestehende Teilmenge von B'_b , die L und eine beliebige andere Komponente enthält, gibt, lassen sich die Ergebnisse aus [GHP] anwenden und man erhält:

$\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, m} : L \rightarrow P_1$ ist ein Isomorphismus, und $\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, m}$ ist auf jeder anderen Komponente konstant. Hieraus folgt, daß $\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, m}$ auf den Zusammenhangskomponenten von $B'_b \setminus L$ konstant ist.

Sei G_b der Schnittgraph von B'_b . G_b ist ein Baum. Die drei Fixpunkte von $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ liegen auf drei nicht notwendig verschiedenen Knoten von G_b . Da $\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, m}$ auf diesen drei Punkten verschieden ist, muß die Komponente L , auf der $\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, m}$ ein Isomorphismus ist, dadurch charakterisiert sein, daß die Wege in G_b von den drei Knoten nach L sich nur in L schneiden. L heißt der Median der drei Knoten in G_b . Liegen zwei oder drei Fixpunkte auf einer Komponente (und damit auf L), so ist diese Komponente der Median. Für L schreibe man:

$$L = m(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = m_b(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = m(\Phi_{\gamma_1}(b), \Phi_{\gamma_2}(b), \Phi_{\gamma_3}(b)) \quad ,$$

wobei je nach Situation der Knoten des Graphen oder die Komponente der Faser gemeint ist. $\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4}(b)$ errechnet sich also folgendermaßen:

Betrachte die Komponente $L = m(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$ in B'_b . $\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, m}$ ist ein Isomorphismus von L nach P_1 . Die Projektion der Fixpunkte $\Phi_{\gamma_i}(b)$ auf L , d.h., auf die Koordinate $\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, m}$, ist der Punkt, in dem die Zusammenhangskomponente von $B'_b \setminus L$, die $\Phi_{\gamma_i}(b)$ enthält, L schneidet, da $\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, m}$ auf den Zusammenhangskomponenten konstant ist, oder der Punkt selbst, falls er schon auf L liegt. Das verallgemeinerte Doppelverhältnis der vier Fixpunkte ist dann das Doppelverhältnis der Projektionen auf L und somit nach Konstruktion gleich der Koordinate $\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4}$. Dabei ist das Doppelverhältnis gleich 0 ($1, \infty$), falls die Projektion des vierten Fixpunktes mit der Projektion des ersten (zweiten, dritten) Fixpunktes übereinstimmt.

$\mathcal{C}$ B_n

Als letztes soll noch auf die schon zitierte Arbeit [GHP] eingegangen werden, da die Varietäten B_n die irreduziblen Komponenten des noch zu definierenden Teichmüllerraums sind. Die Konstruktion von B_n ist analog zu der von B_I , nur ist in diesem Fall $I = \{1, \dots, n\}$. Man hat die Projektion $\pi : B_{n+1} \rightarrow B_n$, indem man auf die Koordinaten ohne $n+1$ projiziert. B_n ist feiner Modulraum für stabile, n -markierte Bäume von projektiven Geraden. $\pi : B_{n+1} \rightarrow B_n$ ist die universelle Familie.

Def.8: Sei C eine zusammenhängende Varietät und $\phi = (\phi_1, \dots, \phi_n)$ ein n -Tupel von paarweise verschiedenen Punkten auf C .

(C, ϕ) heißt *stabiler, n -markierter Baum von projektiven Geraden*, wenn gilt:

- (i) Jede Komponente von C ist isomorph zu P_1 .
- (ii) Jeder singuläre Punkt ist ein gewöhnlicher Doppelpunkt.
- (iii) Der Schnittgraph von C ist ein Baum.
- (iv) Die Menge $\{\phi_1, \dots, \phi_n\} \cup \text{Sing}(C)$ hat auf jeder Komponente von C mindestens drei Punkte.
- (v) $\{\phi_1, \dots, \phi_n\} \cap \text{Sing}(C) = \emptyset$.

Bem.3: Man konstruiert n Schnitte $\phi_n : B_n \rightarrow B_{n+1}$, die die n Marken definieren. Es gilt wieder $\lambda_{i_1, i_2, i_3, i_4}(b)$ ist das Doppelverhältnis der Marken $\phi_{i_1}(b), \dots, \phi_{i_4}(b)$ im vorher beschriebenen Sinn. Es gilt:

Satz2: B_n ist nichtsinguläre Varietät, birational zu P_1^{n-3} .

Bew.: [GHP], Seite 148

Bem.4: Zu jedem Punkt $x \in B_n$ läßt sich auf folgende Weise ein abgeschlossenes Unterschema konstruieren:

Betrachte den n -markierten Baum über x . Sein Schnittgraph G_x trägt eine durch die n Marken induzierte Markierung ψ_x auf den Knoten

$$\psi_x : \{1, \dots, n\} \rightarrow G_x^0$$

Man definiert nun:

$$B(G_{x'}, \psi_{x'}) = \{x' \in B_n \mid \text{Der Schnittgraph } G_{x'} \text{ kontrahiert auf } G_x \text{ und die} \\ \text{aus } \psi_{x'} \text{ entstehende Markierung ist } \psi_x\}$$

In Gleichungen kann man $B(G_x, \psi_x)$ schreiben als:

$$B(G_x, \psi_x) = \{x' \in B_n \mid \lambda_{i_1, i_2, i_3, i_4}(x') = 0 \forall i_1, i_2, i_3, i_4 \text{ mit } \lambda_{i_1, i_2, i_3, i_4}(x) = 0\}$$

Lemma3: $B(G_x, \psi_x)$ ist isomorph zu $\prod_{k \in G_x^0} B_{\text{val}(k)}$,

wobei $\text{val}(k) = \sharp(\psi_x^{-1}(k)) + \text{Valenz von } k \text{ in } G_x$.

Insbesondere ist $B(G_x, \psi_x)$ irreduzibel und glatt.

Bew.: [GHP], Seite 138

§2 T_g^d

Es soll nun der Teil von $\tilde{S}_g$ betrachtet werden, über dem die Kurven in $\tilde{C}_g$ total degeneriert sind, d.h., jede Komponente isomorph zu P_1 ist. Eine Schottky-Überlagerung einer solchen Kurve ist stets die universelle Überlagerung und die Schottkygruppe ist folglich die Fundamentalgruppe. Dieser Teil T_g^d ist also der Teichmüllerraum für total degenerierte Kurven.

Ein Punkt in $\tilde{S}_g$ gehört zu T_g^d , wenn die Isotropiegruppe jeder Komponente der zugehörigen Kurve in $\tilde{\Omega}_g$ die triviale Gruppe ist, d.h., jedes Element $\gamma \in F_g$ hält keine Komponente fest. Das ist genau dann der Fall, wenn der Multiplikator $t_\gamma := \lambda_{\gamma, \gamma^{-1}, \gamma', \gamma \gamma' \gamma^{-1}}$ gleich 0 ist. T_g^d ist also gegeben durch die Gleichungen:

Def.1: $T_g^d = \{s \in \tilde{S}_g | t_\gamma(s) = 0 \forall \gamma \in I\}$

Der Begriff Fixpunkt eines Elementes $\gamma \in F_g$ für die Aktion auf der Faser $\tilde{X}$ in $\tilde{\Omega}_g$ ist über T_g^d näher zu erklären. Betrachte den Schnittgraphen $\tilde{G}$ zu $\tilde{X}$. Da $\tilde{X}$ total degeneriert ist, operiert jedes Element $\gamma \in F_g$ fixpunktfrei. Das Element γ hat in $\tilde{G}$ eine Achse, auf der die Operation von γ durch Verschieben erfolgt. Der anziehende Fixpunkt liegt dann auf dem Ende der Achse, zu dem hin γ schiebt. Ein solcher Punkt liegt in B' , da B' kompakt ist, jedoch nach Konstruktion nicht in $\tilde{\Omega}_g$. Zur Berechnung von Medianen und Doppelverhältnissen ist die Kenntnis der Achse von γ stets ausreichend. Als erstes soll die Struktur von T_g^d untersucht werden. Es stellt sich heraus, daß T_g^d aus unendlich vielen irreduziblen Komponenten besteht. Jede ist isomorph zu B_{2g} . Die äußere Automorphismengruppe $OutF_g$ von F_g operiert transitiv auf diesen Komponenten. Sei $\sigma = (\gamma_1, \dots, \gamma_g)$ eine Basis von F_g . Identifiziere im folgenden $\gamma_1, \dots, \gamma_g$ mit $1, \dots, g$ und $\gamma_1^{-1}, \dots, \gamma_g^{-1}$ mit $-1, \dots, -g$, so erhält man eine Projektion π_σ von T_g^d nach B_{2g} , indem man auf die Koordinaten projiziert, in denen nur Elemente von σ vorkommen. Als erstes wird ein Schnitt f_σ für π_σ konstruiert, dessen Bild eine irreduzible Komponente von T_g^d ist. T_g^d wird von diesen Schnitten überdeckt. Zur Definition von f_σ benötigt man ein technisches Lemma:

Lemma1: Seien $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in F_g$ primitive Elemente und $\sigma = (\gamma_1, \dots, \gamma_g)$ eine Basis von F_g . $st(\alpha) = st_\sigma(\alpha)$ bezeichne das Basiselement (oder ein

Inverses), mit dem die Darstellung von α in σ beginnt. Dann gibt es ein eindeutig bestimmtes $\mu = \mu(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \mu_\sigma(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ mit

$$\#\{st(\mu\alpha_1\mu^{-1}), st(\mu\alpha_2\mu^{-1}), st(\mu\alpha_3\mu^{-1})\} = 3$$

Bew.: Der Beweis ist möglich allein durch Rechnen in F_g , siehe [P]. Ich möchte hier einen geometrische Beweis bringen, ohne zu sehr in technische Details zu gehen:

Betrachte den Graphen G_0 mit einem Knoten und g Schleifen. Die Fundamentalgruppe dieses Graphen ist isomorph zu F_g . Die Wege durch die Schleifen mögen die Basis σ von F_g induzieren. Betrachte die universelle Überlagerung $\tilde{G}_0$ von G_0 . $\tilde{G}_0$ ist ein $2g$ -regulärer, unendlicher Baum, und F_g operiert transitiv auf den Knoten. Seien nun $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ gegeben, so gibt es ein eindeutig bestimmtes $\mu \in F_g$ mit $\mu(m(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)) = P_0$ für einen beliebigen Knoten P_0 aus $\tilde{G}_0$. Wähle $P_0 = m(\gamma_1, \gamma_1^{-1}, \gamma_2)$. Man sieht leicht (vergleiche Folgerung aus Satz 2.1), daß

$$m(\nu_1, \nu_2, \nu_3) = P_0 \Leftrightarrow \#\{st(\nu_1), st(\nu_2), st(\nu_3)\} = 3$$

Aus $\mu(m(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)) = m(\mu\alpha_1\mu^{-1}, \mu\alpha_2\mu^{-1}, \mu\alpha_3\mu^{-1})$ folgt die Behauptung.

f_σ läßt sich nun definieren als:

Def.2: Sei $\sigma = (\gamma_1, \dots, \gamma_g)$ Basis von F_g und $p \in B_{2g}$, dann sei $f_\sigma(p) := (\alpha_{\nu_1, \dots, \nu_4})$, wobei:

$$\mu := \mu_\sigma(\nu_1, \nu_2, \nu_3), \quad i_k := st_\sigma(\mu\nu_k\mu^{-1}) \quad (i_k \in \{-g, \dots, -1, 1, \dots, g\})$$

$$\alpha_{\nu_1, \dots, \nu_4} = \begin{cases} \lambda_{i_1, i_2, i_3, i_4}(p) & , \text{ falls } \#\{i_1, \dots, i_4\} = 4 \\ 0 & , \text{ falls } i_1 = i_4 \\ \infty & , \text{ falls } i_2 = i_4 \\ 1 & , \text{ falls } i_3 = i_4 \end{cases}$$

Falls $f_\sigma(B_{2g}) \subset T_g^d$, so ist f_σ ein Schnitt für π_σ nach Konstruktion.

Lemma2: $f_\sigma(B_{2g}) \subset T_g^d$

Bew.: Zuerst ist zu zeigen, daß $f_\sigma(p) \in B_I^{F_g}$. Die F_g -Invarianz ist klar nach Konstruktion, es bleiben die Doppelverhältnissgleichungen zu zeigen:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & \lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4} = (\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_4, \gamma_3})^{-1} \\ \text{(ii)} \quad & \lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4} = 1 - \lambda_{\gamma_2, \gamma_3, \gamma_4, \gamma_1} \end{aligned}$$

Sei $\mu = \mu(\nu_1, \nu_2, \nu_3)$. Falls $\mu = \mu(\nu_1, \nu_2, \nu_4)$ ist, sind die Gleichungen erfüllt, weil sie in B_{2g} gelten. Sei jetzt $st(\mu\nu_1\mu^{-1}) = st(\mu\nu_4\mu^{-1})$ (Die restlichen Fälle sind analog).

$$\Rightarrow \lambda_{\nu_1, \nu_2, \nu_3, \nu_4}(f_\sigma(p)) = 0$$

Sei $\mu' = \mu'(\nu_1, \nu_2, \nu_4)$, so folgt aus der Eindeutigkeit von μ und μ' , daß

$$\begin{aligned} st(\mu'\nu_2\mu'^{-1}) &= st(\mu'\nu_3\mu'^{-1}) \\ \Rightarrow \lambda_{\nu_1, \nu_2, \nu_4, \nu_3}(f_\sigma(p)) &= \infty \end{aligned}$$

Analog folgt $\lambda_{\nu_2, \nu_3, \nu_4, \nu_1}(f_\sigma(p)) = 1$. Etwas mehr Schwierigkeiten bereitet die Gleichung:

$$\text{(iii)} \quad \lambda_{\nu_1, \nu_2, \nu_3, \nu_4} \cdot \lambda_{\nu_1, \nu_2, \nu_4, \nu_5} = \lambda_{\nu_1, \nu_2, \nu_3, \nu_5}$$

Falls $\mu(\nu_1, \nu_2, \nu_3) = \mu(\nu_1, \nu_2, \nu_4)$ ist, folgt die Gleichung aus der entsprechenden Gleichung in B_{2g} .

Sei also nach Konjugation der ganzen Gleichung $\mathbb{C}$:

$$\begin{aligned} \mu(\nu_1, \nu_2, \nu_3) &= id, \quad st(\nu_1) = st(\nu_4) \quad (\text{Rest analog}), \quad \mu' = \mu(\nu_1, \nu_2, \nu_4) \\ \text{und } x &= \lambda_{st(\mu'\nu_1\mu'^{-1}), st(\mu'\nu_2\mu'^{-1}), st(\mu'\nu_4\mu'^{-1}), st(\mu'\nu_5\mu'^{-1})}(p) \end{aligned}$$

Die Gleichung lautet dann:

$$\lambda_{st(\nu_1), st(\nu_2), st(\nu_3), st(\nu_5)}(p) = 0 \cdot x, \quad \text{da } \lambda_{st(\nu_1), st(\nu_2), st(\nu_3), st(\nu_4)}(p) = 0$$

Für $x = \infty$ ist diese Gleichung homogen geschrieben stets wahr, sei also $x \neq \infty$. Es ist zu zeigen, daß $\lambda_{st(\nu_1), st(\nu_2), st(\nu_3), st(\nu_5)}(p) = 0$. Dies gilt, falls $st(\nu_1) = st(\nu_5)$ ist. Aus $x \neq \infty$ folgt:

$$st(\mu'\nu_2\mu'^{-1}) \neq st(\mu'\nu_5\mu'^{-1}) \Rightarrow st(\nu_2) = st(\mu'^{-1}) \text{ oder } st(\nu_5) = st(\mu'^{-1})$$

Nach Definition von μ' ist:

$$st(\mu'\nu_1\mu'^{-1}) \neq st(\mu'\nu_4\mu'^{-1}) \Rightarrow st(\nu_1) = st(\mu'^{-1}) \text{ oder } st(\nu_4) = st(\mu'^{-1})$$

Da $st(\nu_1) = st(\nu_4)$ folgt, daß $st(\nu_1) = st(\mu'^{-1})$, also ist $st(\nu_2) \neq st(\mu'^{-1})$ nach Definition von μ' . Folglich ist $st(\nu_5)$ auch gleich $st(\mu'^{-1})$.

Es bleibt zu zeigen, daß alle Multiplikatoren 0 sind. Da dann auch alle Isotropiegruppen trivial sind, sind die Bedingungen für $\tilde{S}_g$ trivialerweise erfüllt. Seien γ, γ' gegeben und $\mu = \mu(\gamma, \gamma^{-1}, \gamma')$, dann ist:

$$\lambda_{\gamma, \gamma^{-1}, \gamma', \gamma \gamma' \gamma^{-1}}(f_\sigma(p)) = \lambda_{st(\mu \gamma \mu^{-1}), st(\mu \gamma^{-1} \mu^{-1}), st(\mu \gamma' \mu^{-1}), st((\mu \gamma \mu^{-1}) \cdot (\mu \gamma' \mu^{-1})(\mu \gamma^{-1} \mu^{-1}))}(f_\sigma(p))$$

Nach Definition von μ ist das Produkt $(\mu \gamma \mu^{-1}) \cdot (\mu \gamma' \mu^{-1})$ gekürzt, folglich ist:

$$st((\mu \gamma \mu^{-1}) \cdot (\mu \gamma' \mu^{-1})(\mu \gamma^{-1} \mu^{-1})) = st(\mu \gamma \mu^{-1}) \Rightarrow t_\gamma = 0,$$

nach Definition von f_σ .

Bem.1: Sei $T_\sigma = f_\sigma(B_{2g})$. Zuerst ist zu untersuchen, wann $T_\sigma = T_{\sigma'}$ und ob $\bigcup_{\sigma} T_\sigma = T_g^d$. Nach Definition ist $T_\sigma = T_{\gamma \sigma \gamma^{-1}}$, d.h., man kann sich auf

Elemente aus $Out \mathcal{F}_g$ beschränken. Außerdem ist $T_\sigma = T_{\sigma'}$, wenn σ aus σ' durch Vertauschen der Indizes oder durch Inversenbildung der Basiselemente entsteht, da sich dann f_σ von $f_{\sigma'}$ nur um einen Automorphismus von B_{2g} unterscheidet. Umgekehrt gilt:

Lemma3: $T_\sigma = T_{\sigma'}$, genau dann, wenn σ' aus σ wie oben beschrieben hervorgeht.

Bew.: Sei $\sigma' = (\delta_1, \dots, \delta_g)$. Für δ_i^{-1} schreibe im weiteren auch δ_{-i} . Setze

$$K = \{st_\sigma(\delta_i) | i = -g, \dots, -1, 1, \dots, g\}$$

Sei durch Konjugation von σ' mit einem geeigneten μ wie in Lemma1 $\#K \geq 3$. Angenommen es ist $\#K < 2g$, so gibt es $\delta_{i_1}, \delta_{i_2}$ mit $st_\sigma(\delta_{i_1}) = st_\sigma(\delta_{i_2}) = \gamma_i$. Zur Vereinfachung sei $i_1 = 1, i_2 = 2, i = 1$. Wähle ein δ_{i_3} mit $st_\sigma(\delta_{i_3}) = \gamma_j \neq \gamma_1$. Zur Vereinfachung wieder $i_3 = 3$. Sei $\mu = \mu_\sigma(\delta_1, \delta_2, \delta_3)$. Da $\#\{st(\mu \delta_1 \mu^{-1}), st(\mu \delta_2 \mu^{-1}), st(\mu \delta_3 \mu^{-1})\} = 3$ ist, ist

$$st(\mu^{-1}) = st(\delta_1) = \gamma_1 \Rightarrow st(\mu \delta_3 \mu^{-1}) = st(\mu)$$

Da $T_\sigma = T_{\sigma'}$, ist $\lambda_{\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_i}$ nicht konstant auf T_σ . Es ist aber

$$\lambda_{\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_i} = \lambda_{st(\mu\delta_1\mu^{-1}), st(\mu\delta_2\mu^{-1}), st(\mu\delta_3\mu^{-1}), st((\mu\delta_i\mu^{-1}))},$$

also ist $st(\mu\delta_i\mu^{-1}) \neq st(\mu\delta_3\mu^{-1}) = st(\mu) \Rightarrow st(\delta_i) = st(\mu^{-1})$

Es würde folgen, daß $\sharp K = 2$, also gilt $\sharp K = 2g$.

Da σ, σ' Basen von F_g sind, ist dies nur möglich, wenn die Darstellung der einen Basiselemente in der anderen Basis die Länge eins hat, also wie oben beschrieben ist, denn sonst gilt:

Sei $\gamma_1 = \prod_{i=1}^n \delta_{j_i}$, so kann man für die δ_{j_i} die Darstellung in σ einsetzen, die aber, da $\sharp K = 2g$ ist, gekürzt ist. Also muß $n = 1$ und damit $\gamma_1 = \delta_{j_1}$ sein. Es folgt die Behauptung.

Bem.2: Es bleibt nun die schwierigere Aufgabe zu zeigen, daß T_g^d von den T_σ überdeckt wird. Da die T_σ als Bilder von kompakten Mengen abgeschlossen in der Zariski-Topologie sind, folgt, daß die T_σ die irreduziblen Komponenten von T_g^d sind. Um dies nun zu zeigen benutzt man den Begriff der geometrischen Basis von F_g . T_σ ist die Menge der Punkte in T_g^d , in denen σ geometrische Basis ist. Da jede Kurve eine geometrische Basis zuläßt, folgt, daß $\bigcup_{\sigma} T_\sigma = T_g^d$. Zunächst soll also der Begriff der geometrischen Basis erläutert werden. Vergleiche hierzu [S], §3 + §5.

Def.3: Sei G ein stabiler Graph vom Geschlecht g , d.h., Schnittgraph einer stabilen, total degenerierten Kurve vom Geschlecht g . Ein Gerüst von G ist ein maximaler, zusammenhängender Teilbaum von G . Sei ein Gerüst K gegeben. Die Fundamentalgruppe von G ist F_g . Durch K ist eine Basis folgendermaßen ausgezeichnet: Es gibt genau g Kanten von G , die nicht in K liegen. Wähle einen Aufpunkt $p_0 \in G$, so gibt es genau einen geschlossenen Weg w (eindeutig bis auf w^{-1}), der genau eine der freien Kanten einmal durchläuft und sonst ganz in K liegt. Die so definierten Wege bilden eine Basis von F_g , die bis auf Reihenfolge der Elemente und Inversenbildung durch K eindeutig bestimmt ist. Eine Basis, die so entsteht, heißt *geometrische Basis*. Sie ist auch folgendermaßen charakterisiert: Sei G_0 der Graph

mit einem Knoten und g Schleifen. Die Kontraktion von K induziert einen Isomorphismus $\pi_1(g) \rightarrow \pi_1(G_0)$. Eine geometrische Basis wird abgebildet auf die Wege, die durch die g Kanten verlaufen.

Bem.3: Der Begriff der geometrischen Basis muß noch mehr an die Situation von Schnittgraphen angepaßt werden. Sei also G der Schnittgraph einer Kurve X , K ein Gerüst von G und σ die durch K induzierte geometrische Basis von $F_g \cong \pi_1(G)$. Betrachte die universelle Überlagerung $\tilde{G}$ von G , und lifte K zu einem zusammenhängenden Teilbaum $\tilde{K}$ von $\tilde{G}$. σ induziert eine Basis von $\text{Deck}(\tilde{G}|G)$. $\tilde{K}$ ist ein Fundamentalbereich für die Aktion von F_g auf den Knoten von $\tilde{G}$ (nicht für die Kanten). Sei l eine Kante in $G \setminus K$. Sei p der Endpunkt von l , den der durch l induzierte Weg w_l in σ zuerst durchläuft. l läßt sich eindeutig zu einer Kante $\tilde{l}$ liften, so daß $\tilde{p}$ in $\tilde{K}$ liegt. Der andere Endpunkt von $\tilde{l}$ sei q . q liegt nicht in $\tilde{K}$. Das Element in F_g , welches q nach $\tilde{K}$ abbildet, entspricht dem Element w_l^{-1} in $\pi_1(G)$. Betrachte jetzt $\text{Deck}(\tilde{X}|X)$, so ist diese Gruppe kanonisch isomorph zu $\text{Deck}(\tilde{G}|G)$, und die geometrische Basis muß auch hier zu finden sein. Die in $\tilde{K}$ liegenden Knoten entsprechen Komponenten von $\tilde{X}$. Sei $\tilde{F}$ die Vereinigung dieser Komponenten, so ist $\tilde{F}$ schon fast ein Fundamentalbereich für $\text{Deck}(\tilde{X}|X)$. Betrachte alle Komponenten, die $\tilde{F}$ schneiden. Diese entsprechen den Knoten q aus $\tilde{G}$. Die geometrische Basis von $\text{Deck}(\tilde{X}|X)$ bildet diese Komponenten nach $\tilde{F}$ ab. Sei L eine solche Komponente und γ das Element, welches L nach $\tilde{F}$ abbildet. Sei M die Komponente von $\tilde{F}$, die L schneidet, so wird M unter γ auf eine Komponente abgebildet, die nicht in $\tilde{F}$ liegt, $\tilde{F}$ aber schneidet. Die Komponenten, die $\tilde{F}$ schneiden, lassen sich also in g Paare (L_i, L_{-i}) aufteilen, so daß für die geometrische Basis $\sigma = (\gamma_1, \dots, \gamma_g)$ gilt:

$$\gamma_i(L_{-i}) \subset \tilde{F}, \gamma_i^{-1}(L_i) \subset \tilde{F}$$

$\tilde{F}$ ist also ein Fundamentalbereich in dem schwachen Sinne, daß noch $L_{-i} \cap \tilde{F}$ und $L_i \cap \tilde{F}$ vermöge γ_i äquivalent sind. Wann immer also eine solche Situation für eine Basis σ von $\text{Deck}(\tilde{X}|X)$ vorliegt, ist σ geometrische Basis von $\text{Deck}(\tilde{X}|X)$. Aus folgendem Satz folgt dann die Behauptung über T_g^d :

Satz1: Genau über T_σ ist σ eine geometrische Basis von F_g für die Aktion von F_g auf der Faser in $\bar{\Omega}_g$.

Folg.1: $T_g^d = \bigcup_{\sigma} T_\sigma$

Folg.2: $T_\sigma \cap T_{\sigma'} \neq \emptyset \Leftrightarrow$ Es gibt einen Graphen G und Gerüste K, K' von G , die σ bzw. σ' induzieren.

Folg.3: Da jeder Graph nur endlich viele Gerüste haben kann und es nur endlich viele stabile Graphen vom Geschlecht g gibt, ist die Anzahl der $T_{\sigma'}$, die ein festes T_σ schneiden, endlich.

Bew.: (Von Satz 1) Nach Definition ist:

$$T_\sigma = \{\lambda_{\nu_1, \nu_2, \nu_3, \nu_4} = \lambda_{st(\mu\nu_1\mu^{-1}), \dots, st(\mu\nu_4\mu^{-1})} | (\nu_1, \dots, \nu_4) \in V\}$$

Für $s \in T_g^d$ ist also zu zeigen

$$\lambda_{\nu_1, \nu_2, \nu_3, \nu_4}(s) = \lambda_{st(\mu\nu_1\mu^{-1}), \dots, st(\mu\nu_4\mu^{-1})}(s) \quad \forall (\nu_1, \dots, \nu_4) \in V \Leftrightarrow$$

σ ist geometrische Basis für die Aktion von F_g auf der Faser über s .

„ $\Rightarrow$ “: Sei $\tilde{F}$ wie in Bemerkung 3 die Liftung eines Gerüsts, welches σ induziert. $\tilde{X} \setminus \tilde{F}$ zerfällt in Zusammenhangskomponenten F_i ($i = -g, \dots, g$), wobei $L_i \subset F_i$, es gilt nach Konstruktion:

Beh.1: $Fixpunkt(\gamma_i) \in F_i$

Folg.: $m(\gamma_i, \gamma_j, \gamma_k) \subset \tilde{F}$

Es soll nun der Median beliebiger Elemente berechnet werden:

Beh.2: Sei $\gamma \in I$, $st(\gamma) = \gamma_i$, so ist $Fixpunkt(\gamma) \in F_i$.

Folg.: Sind $st(\gamma), st(\gamma'), st(\gamma'')$ paarweise verschieden, so ist $m(\gamma, \gamma', \gamma'') = m(st(\gamma), st(\gamma'), st(\gamma''))$, insbesondere hängt die Projektion des Fixpunkte von γ auf eine Komponente von $\tilde{F}$ nur von $st(\gamma)$ ab.

Bew.2: Die Behauptung folgt aus folgender Aussage:

Beh.: Die Komponente F_i , in der der anziehende Fixpunkt von γ liegt, ist dadurch charakterisiert, daß es ein k_0 gibt mit:

$$\gamma(F_j) \subset F_i \quad \forall j \neq k_0$$

Es gilt dann mit Induktion über die Länge l der Darstellung von γ in σ :

Für $l = 1$ folgt Behauptung 2 aus Behauptung 1, sei also $l(\gamma) > 1$:

Sei $\mathbb{C}\gamma = \gamma_1 \cdot \gamma'$ gekürzt. Nach Induktionsvoraussetzung ist $\text{Fixpunkt}(\gamma') \in F_i$, wenn $st(\gamma') = \gamma_i$, d.h., es gibt ein k_0 mit:

$$\gamma'(F_j) \subset F_i \quad \forall j \neq k_0$$


Da $\gamma_1(F_j) \subset F_1$ ist ($l = 1$) folgt, daß:

$$\gamma(F_j) \subset F_1 \quad \forall j \neq k_0$$

Bem.: Es folgt, daß $st(\gamma^{-1}) = \gamma_{-k_0}$ ist.

Bew.: (Der Behauptung) Der Fixpunkt von γ liege in F_i , der Fixpunkt von γ^{-1} liege in F_k (nicht notwendig $i \neq k$). Die Achse von γ verläuft dann von F_k nach F_i (oder sie liegt ganz in F_i wenn $i = k$). Da γ auf der Achse schiebt, werden alle F_j mit $j \neq k$ nach F_i geschoben.

Bild:



Für $i = k$ ist die Situation ähnlich.

Nun zum Beweis der einen Richtung:

Sei σ geometrische Basis in s ; $\nu_1, \dots, \nu_4$ gegeben und $\mu = \mu(\nu_1, \nu_2, \nu_3)$, dann ist:

$$\begin{aligned} \lambda_{\nu_1, \nu_2, \nu_3, \nu_4}(s) &= \lambda_{\mu\nu_1\mu^{-1}, \dots, \mu\nu_4\mu^{-1}}(s) && \text{Gleich. (iv)} \\ &= DV_s(Fix(\mu\nu_1\mu^{-1}), \dots, Fix(\mu\nu_4\mu^{-1})) && \text{Bem.1.2} \\ &= DV_s(Fix(st(\mu\nu_1\mu^{-1}), \dots, Fix(st(\mu\nu_4\mu^{-1}))) && \text{Folg. Beh.2} \\ &= \lambda_{st(\mu\nu_1\mu^{-1}), \dots, st(\mu\nu_4\mu^{-1})}(s) && \text{Bem.1.2} \end{aligned}$$

„ $\Leftarrow$ “: Zum Beweis dieser Richtung kehrt man die Konstruktion um. Sei $s \in T_g^d$, $\tilde{X} = \pi^{-1}(s) \subset \tilde{\Omega}_g$, $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_g)$ eine Basis von F_g , so setze

$$\tilde{F}_\sigma = \bigcup_{i,j,k \in \{-g, \dots, -1, 1, \dots, g\}} m(\gamma_i, \gamma_j, \gamma_k) \subset \tilde{X}$$

Falls die Behauptung richtig ist, muß gelten, daß $\tilde{F}_\sigma$ von der Liftung eines Gerüsts herkommt und dieses Gerüst σ als geometrische Basis induziert. $\tilde{F}_\sigma$ muß also die Bedingungen aus Bemerkung 3 erfüllen.

Beh.3: $\tilde{F}_\sigma$ ist Fundamentalbereich für die Aktion von F_g auf den Komponenten von $\tilde{X}$.

Bew.3:

a) Sei L eine beliebige Komponente von $\tilde{X}$. Da $\tilde{X}$ stabil, gibt es $\nu_1, \nu_2, \nu_3 \in F_g$ mit $m(\nu_1, \nu_2, \nu_3) = L$. Sei $\mu = \mu(\nu_1, \nu_2, \nu_3)$, so gilt:


$$\begin{aligned} \mu(L) &= \mu(m(\nu_1, \nu_2, \nu_3)) \\ &= m(\mu\nu_1\mu^{-1}, \mu\nu_2\mu^{-1}, \mu\nu_3\mu^{-1}) \\ &= m(st(\mu\nu_1\mu^{-1}), st(\mu\nu_2\mu^{-1}), st(\mu\nu_3\mu^{-1})) \subset \tilde{F}_\sigma, \end{aligned}$$

denn falls $\#\{st(\nu_1), st(\nu_2), st(\nu_3)\} = 3$ ist, ist

$$L = m(\nu_1, \nu_2, \nu_3) = m(st(\nu_1), st(\nu_2), st(\nu_3)) = L'$$

Begr.: Angenommen $L \neq L'$. $\tilde{X} \setminus L'$ zerfällt in Zusammenhangskomponenten F_i , und es sei $L \subset F_1$. Da $L = m(\nu_1, \nu_2, \nu_3)$ ist, sind die

Projektionen der Fixpunkte von ν_1, ν_2, ν_3 auf L verschieden, d.h., zwei der drei Fixpunkte liegen in F_1 , denn:



Die Projektion auf L von Fixpunkten, die in den Komponenten $F_2, F_3, \dots$ liegen, ist stets p .

Seien also $\mathbb{C}$ die Fixpunkte von ν_1 und ν_2 in F_1 . Die Projektion auf L' ist dann gleich, und es folgt (Bem.1.2):

$$\lambda_{st(\nu_1), st(\nu_2), st(\nu_3), \nu_1}(s) = \lambda_{st(\nu_1), st(\nu_2), st(\nu_3), \nu_2}(s)$$

Nach Voraussetzung gilt aber, daß der linke Wert 0 und der rechte Wert ∞ ist.

- b) Seien $L, L' \subset \tilde{F}_\sigma$ und $\mu(L) = L'$. Zu zeigen ist dann, daß $\mu = id$. Sei also $\mu \neq id$, $L = m(\gamma_{i_1}, \gamma_{i_2}, \gamma_{i_3})$, $L' = m(\gamma_{j_1}, \gamma_{j_2}, \gamma_{j_3})$.

$$\Rightarrow \mu(L) = m(\mu\gamma_{i_1}\mu^{-1}, \mu\gamma_{i_2}\mu^{-1}, \mu\gamma_{i_3}\mu^{-1}) = m(\gamma_{j_1}, \gamma_{j_2}, \gamma_{j_3})$$

$$\Rightarrow \lambda_{\mu\gamma_{i_1}\mu^{-1}, \mu\gamma_{i_2}\mu^{-1}, \mu\gamma_{i_3}\mu^{-1}, \nu}(s) = \lambda_{\gamma_{j_1}, \gamma_{j_2}, \gamma_{j_3}, \nu}(s) \quad \forall \nu \in I$$

$$\Rightarrow \lambda_{\gamma_{i_1}, \gamma_{i_2}, \gamma_{i_3}, \mu^{-1}\nu\mu}(s) = \lambda_{\gamma_{j_1}, \gamma_{j_2}, \gamma_{j_3}, \nu}(s) \quad \forall \nu \in I$$

Setze nun $\nu = \gamma_{j_1}, \gamma_{j_2}, \gamma_{j_3}$, so ist für höchstens ein γ_{j_k} $st(\mu^{-1}\nu\mu) \neq st(\mu^{-1})$, d.h., die linke Seite nimmt nach Voraussetzung höchstens zwei verschiedene Werte an, die rechte Seite aber wird 0, 1, ∞ .

Es folgt Behauptung 3. Betrachte nun

$$\bar{L} = \{L_i \subset \tilde{X} \text{ Komponente} | L_i \cap \tilde{F}_\sigma \neq \emptyset, L_i \not\subset \tilde{F}_\sigma\}$$

Zu zeigen ist, daß $\bar{L} = \{L_{-g}, \dots, L_{-1}, L_1, \dots, L_g\}$ und $\gamma_i(L_{-i}) \subset \tilde{F}_\sigma$.


Beh.4: $\tilde{F}_\sigma$ ist zusammenhängend und

$$\tilde{X} \setminus \tilde{F}_\sigma = \bigcup_{i=-g, \dots, -1, 1, \dots, g} F_i$$

so nummeriert, daß der Fixpunkt von γ_i in F_i liegt. F_i die Zusammenhangskomponenten.

Bew.4: Sei $\tilde{X} \setminus \tilde{F}_\sigma = \bigcup_{i=1}^n F_i$. Es ist $n \geq 2g$, denn sonst lägen in einem F_i Fixpunkte von zwei Basiselementen, z.B. von γ_1 und γ_2 . Dann ist $m(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_j) \subset F_i$, also nicht in $\tilde{F}_\sigma$. Da $\tilde{F}_\sigma$ Fundamentalbereich ist, ist es die Vereinigung der Liftungen aller Komponenten von $\tilde{X}/F_g$, nur ist $\tilde{F}_\sigma$ nicht notwendig zusammenhängend. Man sieht leicht, daß $\tilde{F}_\sigma$ zusammenhängend ist, genau dann, wenn $n = 2g$.

a) F sei eine Zusammenhangskomponente aus endlich vielen Komponenten. Sei $L \subset F$ eine Komponente.



Solche W_i müssen existieren, da jede Zusammenhangskomponente von $\tilde{X} \setminus L$ aus unendlich vielen Komponenten besteht. W_1, W_2, W_3 sind Mediane von Fixpunkten von Basiselementen. Je zwei dieser drei Fixpunkte können nicht in der Zusammenhangskomponente von $\tilde{X} \setminus W_i$, in der L liegt, liegen. Wähle jeweils einen dieser beiden aus, so ist der Median dieser drei Basiselemente gleich L , da die Projektionen der Fixpunkte auf L verschieden sind. L liegt also schon in $\tilde{F}_\sigma$.

b) Sei F eine Zusammenhangskomponente aus unendlich vielen Komponenten, und in F liege kein Fixpunkt eines Basiselementes. Sei $w \in I$ so gewählt, daß der Fixpunkt von w in F liegt. Dies ist immer möglich, da man ansonsten Komponenten aus F nicht als Median schreiben könnte

(vgl. Beweis 3a). Sei $\langle w = \gamma_1 \cdot w' \rangle$ gekürzt. Sei $M = m(\gamma_{i_1}, \gamma_{i_2}, \gamma_{i_3}) \subset \tilde{F}_\sigma$ die Komponente in $\tilde{F}_\sigma$, für die $F \cap M \neq \emptyset$. Es ist

$$\lambda_{\gamma_{i_1}, \gamma_{i_2}, \gamma_{i_3}, w}(s) = \lambda_{\gamma_{i_1}, \gamma_{i_2}, \gamma_{i_3}, \gamma_1}(s)$$

d.h., die Projektion des Fixpunktes von γ_1 und des Fixpunktes von w auf M sind gleich. Das kann aber nur sein, wenn der Fixpunkt von γ_1 in F liegt.

Damit ist Behauptung 4 bewiesen. In jeder Zusammenhangskomponente liegt genau ein $L_i \in \bar{L}$. Die Nummerierung sei so gewählt, daß $L_i \subset F_i$ und der Fixpunkt von γ_i in F_i liegt. Zu zeigen ist noch:

Beh.5: $\gamma_{-i}(L_i) \subset \tilde{F}_\sigma$

Bew.5: Da der Fixpunkt von γ_i in F_i und der Fixpunkt von γ_i^{-1} in F_{-i} liegt, verläuft die Achse von γ_i , die die beiden Fixpunkte verbindet, durch L_i , d.h., L_i liegt auf der Achse von γ_i . Da $\tilde{F}_\sigma$ Fundamentalbereich ist, gibt es ein γ mit $M = \gamma(L_i) \subset \tilde{F}_\sigma$. Der Weg von M nach L_i enthält ein Stück der Achse von γ und die Verschiebungslänge von γ auf der Achse ist gleich der Länge dieses Stückes. Da $M \subset \tilde{F}_\sigma$ und $L_i \cap \tilde{F}_\sigma \neq \emptyset$ ist, liegt der Weg ganz in $\tilde{F}_\sigma$. Da Komponenten in $\tilde{F}_\sigma$ zueinander nicht äquivalent sind, muß die Achse von γ gleich diesem Weg sein, d.h., M und L_i liegen auf der Achse. Es folgt, daß der Fixpunkt von γ^{-1} in F_i liegt. Wie in Beweis 4 folgt, daß $st(\gamma^{-1}) = \gamma_i$ ist. Sei also $\gamma = \gamma' \cdot \gamma_i^{-n}$, $n \geq 1$, $st(\gamma'^{-1}) = \gamma_j \neq \gamma_i, \gamma_{-i}$. Wie man leicht sieht (vgl. Beweis 2), ist dann $\gamma'^{-1}(M) \subset F_j$ und $\gamma_i^n(F_j) \subset F_i$, aber $\gamma_i^n(F_j) \cap \tilde{F}_\sigma = \emptyset$, da $F_j \cap F_i = \emptyset$. Es folgt, daß $\gamma' = id$, d.h., $\gamma_i^{-n}(L_i) = M$. Da L_i auf der Achse von γ_i liegt und die Komponenten in $\tilde{F}_\sigma$ nicht äquivalent sind, ist dies nur möglich, wenn $n = 1$ ist, d.h., $\gamma = \gamma_i^{-1}$, also $\gamma_i^{-1}(L_i) \subset \tilde{F}_\sigma$, wie gefordert.

Damit ist Satz 1 bewiesen.

Folg.: (Aus dem Beweis) Sei σ geometrische Basis, so gilt mit den Bezeichnungen des Beweises:

$$m(\gamma, \gamma', \gamma'') \subset \tilde{F}_\sigma \Leftrightarrow \#\{st(\gamma), st(\gamma'), st(\gamma'')\} = 3$$

Bem.4: Mit Hilfe von Satz 1 hat man nun die Möglichkeit, explizit zu berechnen, welche Komponenten $T_{\sigma'}$ ein festes T_{σ} schneiden. Für $g=2,3$ wird dies in §5 ausgeführt. Zunächst soll untersucht werden, welchen Durchschnitt zwei Komponenten haben.

§3 Der Durchschnitt zweier Komponenten

Ziel dieses Paragraphen ist es zu beweisen, daß $T_\sigma \cap T_{\sigma'}$ von der Form $B(T, \psi)$, wie in Bemerkung 1.4 definiert, ist. Insbesondere ist also $T_\sigma \cap T_{\sigma'}$ einfach zusammenhängend. Das gibt die Möglichkeit, den einfachen Zusammenhang von T_g^d zu beweisen. Sei also $T_\sigma \cap T_{\sigma'} \neq \emptyset$, $x \in T_\sigma \cap T_{\sigma'}$, $\tilde{G}_x$ der Schnittgraph der Faser $\tilde{X}$ in $\bar{\Omega}_g$ über x . σ und σ' sind geometrische Basen für die Aktion von F_g auf $\tilde{G}_x$.

Def.1: Sei $F_\sigma(p) = x$, so setze:

$$\begin{aligned} B_{\sigma,x} &= \{p' \in B_{2g} \mid \lambda_{i_1, i_2, i_3, i_4}(p') = 0 \forall i_1, i_2, i_3, i_4 \text{ mit } \lambda_{i_1, i_2, i_3, i_4}(p) = 0\} \\ B_{\sigma,x}^* &= \{p' \in B_{\sigma,x} \mid \lambda_{i_1, i_2, i_3, i_4}(p') \neq 0 \forall i_1, i_2, i_3, i_4 \text{ mit } \lambda_{i_1, i_2, i_3, i_4}(p) \neq 0\} \\ T_{\sigma,x} &= f_\sigma(B_{\sigma,x}) \\ T_{\sigma,x}^* &= f_\sigma(B_{\sigma,x}^*) \end{aligned}$$

Lemma1:

- (i) $B_{\sigma,x}^*$ ist offen und dicht in $B_{\sigma,x}$.
- (ii) Für $x' \in T_{\sigma,x}^*$ ist $\tilde{G}_{x'} \cong \tilde{G}_x$, und die Aktion von F_g ist verträglich mit dem Isomorphismus.

Bew.:

- (i) $B_{\sigma,x}$ ist nach Definition gleich $B(T_p, \psi_p)$, also glatt nach Lemma 1.3. $B_{\sigma,x}^*$ ist durch Ungleichungen gegeben, also offen und dicht, da $p \in B_{\sigma,x}^*$.
- (ii) Sei L Knoten von $\tilde{G}_x$. $L = m_x(\nu_1, \nu_2, \nu_3)$, setze $\alpha(L) = m_{x'}(\nu_1, \nu_2, \nu_3)$, so definiert α eine Abbildung auf den Knoten von $\tilde{G}_x$ nach $\tilde{G}_{x'}$. Da $\tilde{G}_x$ und $\tilde{G}_{x'}$ Bäume sind, induziert α einen Isomorphismus der Graphen, wenn α ein Isomorphismus auf den Knoten ist und benachbarte Knoten auf benachbarte Knoten abbildet. Zum Beweis von (ii) ist also zu zeigen:

- (1) α ist wohldefiniert, d.h., falls $L = m_x(\nu'_1, \nu'_2, \nu'_3)$, ist

$$m_{x'}(\nu_1, \nu_2, \nu_3) = m_{x'}(\nu'_1, \nu'_2, \nu'_3)$$

- (2) α ist auf den Knoten bijektiv.
- (3) α ist verträglich mit "benachbart".
- (4) α ist verträglich mit der Aktion von F_g .

Nach Konstruktion gilt:

$$\lambda_{\nu_1, \nu_2, \nu_3, \nu_4}(x') = 0 \Leftrightarrow \lambda_{\nu_1, \nu_2, \nu_3, \nu_4}(x) = 0$$

- (1) Sei $L = m_x(\nu'_1, \nu'_2, \nu'_3)$, $K = m_{x'}(\nu_1, \nu_2, \nu_3)$, $K' = m_{x'}(\nu'_1, \nu'_2, \nu'_3)$ und $K \neq K'$. Wie im Beweis von Behauptung 3a in Satz 2.1 folgt, daß zwei der drei Fixpunkte von ν_1, ν_2, ν_3 in der gleichen Zusammenhangskomponente von $\tilde{X}' \setminus K'$ liegen. Sei also $\mathbb{E}$:


$$\begin{aligned} \lambda_{\nu'_1, \nu'_2, \nu'_3, \nu_1}(x') &= \lambda_{\nu'_1, \nu'_2, \nu'_3, \nu_2}(x') \\ \Rightarrow \lambda_{\nu_2, \nu'_1, \nu'_2, \nu_1}(x') &= 0 \\ \Rightarrow \lambda_{\nu_2, \nu'_1, \nu'_2, \nu_1}(x) &= 0 \\ \Rightarrow \lambda_{\nu'_1, \nu'_2, \nu_1, \nu_2}(x) &= 1 \\ \Rightarrow \lambda_{\nu'_1, \nu'_2, \nu'_3, \nu_1}(x) &= \lambda_{\nu'_1, \nu'_2, \nu'_3, \nu_2}(x) \end{aligned}$$

Da aber $m_x(\nu_1, \nu_2, \nu_3) = m_x(\nu'_1, \nu'_2, \nu'_3)$ ist, sind der rechte und der linke Wert verschieden.

- (2) Da in $T_{\sigma, x}^*$ eine Koordinate genau dann 0 wird, wenn sie in x den Wert 0 annimmt, läßt sich die Umkehrabbildung analog definieren, und sie ist aus demselben Grund wohldefiniert.
- (3) Der Begriff "benachbart" muß in die Sprache der Koordinaten übersetzt werden. Seien L_1, L_2 zwei Komponenten von $\tilde{X}$, so gibt es stets Elemente $\nu_1, \nu_2 \in I$, so daß L_1 und L_2 auf dem unendlichen Baum B liegen, der die Fixpunkte von ν_1 und ν_2 verbindet. (Wähle Elemente, deren Fixpunkte nicht in der Zusammenhangskomponente von $\tilde{X} \setminus L_1$ (bzw. L_2) liegen, in der L_2 (bzw. L_1) liegt.) Es gibt dann Elemente $\nu_3, \nu_4 \in I$, so daß

$$L_1 = m(\nu_1, \nu_2, \nu_3), L_2 = m(\nu_1, \nu_2, \nu_4)$$

ist. L_1 und L_2 sind benachbart, wenn es keine Komponente L_3 auf B gibt, die zwischen L_1 und L_2 liegt.



L_1 und L_2 sind also benachbart, wenn es kein ν_5 gibt, mit:

$$\lambda_{\nu_2, \nu_1, \nu_3, \nu_5} = 0 \text{ und } \lambda_{\nu_1, \nu_2, \nu_4, \nu_5} = 0$$

Da dies in der Faser über x genau dann der Fall ist, wenn es in der Faser über x' auftritt, bleibt "benachbart" erhalten.

- (4) Da $\gamma(m(\nu_1, \nu_2, \nu_3)) = m(\gamma\nu_1\gamma^{-1}, \gamma\nu_2\gamma^{-1}, \gamma\nu_3\gamma^{-1})$ ist, ist die Verträglichkeit mit der Aktion von F_g trivial.

Folg.: Da die Graphen $\tilde{G}_x$ und $\tilde{G}_{x'}$ isomorph sind, sind σ und σ' auch in x' geometrische Basen, d.h., $T_{\sigma, x}^* \subset T_\sigma \cap T_{\sigma'}$. Da der Durchschnitt abgeschlossen ist, folgt, daß

$$T_{\sigma, x} \subset T_\sigma \cap T_{\sigma'}$$

Bem.1: Der Beweis der Folgerung ist auch möglich nur durch Rechnen in den Koordinaten. Zu zeigen ist, daß für $x' \in T_{\sigma, x}^*$ $f_{\sigma'}(\pi_{\sigma'}(x')) = x'$ ist. In Koordinaten gibt das die Gleichung:

$$(\mu = \mu_\sigma(\nu_1, \nu_2, \nu_3), \mathbb{E}_{\mu_{\sigma'}}(\nu_1, \nu_2, \nu_3) = id)$$

$$\lambda_{st_\sigma(\mu st_{\sigma'}(\nu_1)\mu^{-1}), \dots, st_\sigma(\mu st_{\sigma'}(\nu_4)\mu^{-1})}(x') = \lambda_{st_\sigma(\mu\nu_1\mu^{-1}), \dots, st_\sigma(\mu\nu_4\mu^{-1})}(x')$$

Dabei ist nur der Fall, daß der zweite Wert ungleich 0, 1, ∞ ist, nicht trivial. Es wird dann schrittweise auf den Fall $\nu_i = st_{\sigma'}(\nu_i)$ für $i = 1, 2, 3$ reduziert. Schwierigkeiten bereitet dann nur der Fall

$$\gamma = st_\sigma(\mu st_{\sigma'}(\nu_4)\mu^{-1}) \neq st_\sigma(\mu\nu_4\mu^{-1}) = \gamma_4$$

Sei $\mathbb{E}\gamma_i = st_\sigma(\mu\nu_i\mu^{-1})$, so ist zu zeigen:

$$\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma}(x') = \lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4}(x')$$

Da $x \in T_\sigma \cap T_{\sigma'}$, ist, gilt $f_{\sigma'}(\pi_{\sigma'}(x)) = x$, d.h.:

$$\begin{aligned} \lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma}(x) &= \lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4}(x) \\ \Rightarrow \lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4}(x) &= 1, \text{ da } \lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4}(x) \neq 0, 1, \infty \\ \Rightarrow \lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4}(x') &= 1, \text{ nach Definition} \\ \Rightarrow \lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma}(x') &= \lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4}(x'), \text{ Doppelverhältnisgleichungen} \end{aligned}$$

Bem.2: Sei ein Punkt $x \in T_\sigma \cap T_{\sigma'}$ gegeben. σ' sei so konjugiert, daß $\tilde{F}_\sigma$ und $\tilde{F}_{\sigma'}$, in der Faser über x eine gemeinsame Komponente haben. $\tilde{G}_\sigma$ bezeichne den $\tilde{F}_\sigma$ entsprechenden Teil in $\tilde{G}_x$. Für den Fall, daß $\tilde{G}_\sigma$ und $\tilde{G}_{\sigma'}$ gemeinsame Kanten haben, kontrahiere diese Kanten und deren F_g -Translate. Man erhält einen neuen Graphen, in dem die Bilder von $\tilde{G}_\sigma$ und $\tilde{G}_{\sigma'}$ sich nur in einem Knoten schneiden. Da alle F_g -Translate kontrahiert worden sind, ist die Kontraktion mit der F_g -Aktion verträglich. Da Kontraktion mit der Bildung von Medianen verträglich ist, sind die Bilder von $\tilde{G}_\sigma$ und $\tilde{G}_{\sigma'}$ wieder die Mediane der Basiselemente in dem neuen Graphen. σ und σ' sind für diesen Graphen geometrische Basen, da $\tilde{G}_\sigma$ und $\tilde{G}_{\sigma'}$ durch die Liftung der kontrahierten Gerüste entstehen. Nach Konstruktion haben die beiden Gerüste keine gemeinsame Kante, da gemeinsame Kanten gerade kontrahiert wurden. Wähle also einen Punkt $x_0 \in T_\sigma \cap T_{\sigma'}$, so daß $\tilde{G}_\sigma \cap \tilde{G}_{\sigma'}$ über x_0 nur aus einem Knoten besteht, d.h., $\tilde{F}_\sigma \cap \tilde{F}_{\sigma'}$ sich in genau einer Komponente schneiden.

Lemma2: $T_\sigma \cap T_{\sigma'} = f_\sigma(B(T_{p_0}, \psi_{p_0}))$, falls $f_\sigma(p_0) = x_0$.

Bew.: Sei $\sigma = (\gamma_1, \dots, \gamma_g)$, so folgt die Behauptung aus folgender Tatsache:

$$\lambda_{\gamma_{i_1}, \gamma_{i_2}, \gamma_{i_3}, \gamma_{i_4}}|_{T_{\sigma, x_0}} \equiv 0 \Rightarrow \lambda_{\gamma_{i_1}, \gamma_{i_2}, \gamma_{i_3}, \gamma_{i_4}}|_{T_{\sigma'}} \equiv 0 \quad (*)$$

Da $x' \in T_{\sigma'}$, ist dann:

$$\lambda_{\gamma_{i_1}, \gamma_{i_2}, \gamma_{i_3}, \gamma_{i_4}}(x') = 0 \quad \forall i_1, i_2, i_3, i_4 \text{ mit } \lambda_{\gamma_{i_1}, \gamma_{i_2}, \gamma_{i_3}, \gamma_{i_4}}(x) = 0$$

und somit ist $x' \in f_\sigma(B(T_{p_0}, \psi_{p_0}))$ nach Definition von $B(T_{p_0}, \psi_{p_0})$.

Zum Beweis von (*):

Zur Vereinfachung der Schreibweise sei $\gamma_{i_k} = \gamma_k$ und $\sigma' = (\delta_1, \dots, \delta_g)$ so konjugiert, daß $st_{\sigma'}(\gamma_i) = \delta_i$, $i = 1, 2, 3$. Es gilt dann, daß


$$m(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = m(st_{\sigma'}(\gamma_1), st_{\sigma'}(\gamma_2), st_{\sigma'}(\gamma_3)) = m(\delta_1, \delta_2, \delta_3) = L \quad ,$$

denn σ' ist geometrische Basis in x_0 , und der Median hängt nur von den Anfangsbuchstaben ab (Behauptung 2 im Beweis von Satz 2.1). L ist somit die einzige Komponente, die $\tilde{F}_\sigma$ und $\tilde{F}_{\sigma'}$ gemeinsam haben. Betrachte nun die Zusammenhangskomponenten von $\tilde{X} \setminus L$, $\tilde{X} \setminus \tilde{F}_\sigma$, $\tilde{X} \setminus \tilde{F}_{\sigma'}$.

Bild:

Fundamentalebereich von σ

Fundamentalebereich von σ'



Es ist $\tilde{X} \setminus L = \bigcup A_i \cup \bigcup B_i$
 $\tilde{X} \setminus \tilde{F}_\sigma = \bigcup A'_i \cup \bigcup B_i$, da $\tilde{F}_\sigma$ ganz in den A_i liegt.
 $\tilde{X} \setminus \tilde{F}_{\sigma'} = \bigcup A_i \cup \bigcup B'_i$, da $\tilde{F}_{\sigma'}$ ganz in den B_i liegt.

Da $\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4}(x) = 0$ ist, müssen die Projektionen der Fixpunkte von γ_1 und γ_4 auf L gleich sein, d.h., die beiden Fixpunkte müssen in dem gleichen A_i oder B_i liegen. Da die B_i Zusammenhangskomponenten von $\tilde{X} \setminus \tilde{F}_\sigma$ sind, können nicht zwei Fixpunkte in einem B_i liegen, d.h., die Fixpunkte liegen beide in einem A_i (welches in mehrere A'_i zerfällt). Da dieses A_i aber Zusammenhangskomponente von $\tilde{X} \setminus \tilde{F}_{\sigma'}$ ist, ist $st_{\sigma'}(\gamma_1) = st_{\sigma'}(\gamma_4)$. Folglich ist

$$\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4}|T_{\sigma'} \equiv 0$$

nach Definition von $f_{\sigma'}$.

Bem.3: Aus (*) folgt:

$$T_\sigma \cap T_{\sigma'} \neq \emptyset, T_\sigma \cap T_{\sigma''} \neq \emptyset, T_{\sigma'} \cap T_{\sigma''} \neq \emptyset \Rightarrow T_\sigma \cap T_{\sigma'} \cap T_{\sigma''} \neq \emptyset$$

Damit läßt sich leicht zeigen, daß die Vereinigung aller $T_{\sigma'}$, die ein festes T_σ schneiden, einfach zusammenhängend ist.

Begr.: Angenommen $T_\sigma \cap T_{\sigma'} \cap T_{\sigma''} = \emptyset$. Sei $T_\sigma \cap T_{\sigma'} = f_\sigma(B(T_1, \psi_1))$ und $T_\sigma \cap T_{\sigma''} = f_\sigma(B(T_2, \psi_2))$, so ist $B(T_1, \psi_1) \cap B(T_2, \psi_2) = \emptyset$. Man sieht leicht, daß es dann eine Koordinate $\lambda_{i_1, i_2, i_3, i_4}$ geben muß, mit

$$\lambda_{i_1, i_2, i_3, i_4}|B(T_1, \psi_1) \equiv 0 \text{ und } \lambda_{i_1, i_2, i_3, i_4}|B(T_2, \psi_2) \equiv \infty.$$

Nach (*) gilt dann:

$$\lambda_{\gamma_{i_1}, \gamma_{i_2}, \gamma_{i_3}, \gamma_{i_4}} | T_{\sigma'} \equiv 0 \text{ und } \lambda_{\gamma_{i_1}, \gamma_{i_2}, \gamma_{i_3}, \gamma_{i_4}} | T_{\sigma''} \equiv \infty$$

Also wäre $T_{\sigma'} \cap T_{\sigma''} = \emptyset$.

Bem.4: Nach Folgerung 2 aus Satz 2.1 läßt sich prinzipiell errechnen, welche $T_{\sigma'}$ ein festes T_{σ} schneiden, also läßt sich auch entscheiden, ob für vorgegebene σ, σ' $T_{\sigma} \cap T_{\sigma'} \neq \emptyset$ ist. Dazu muß man jedoch alle schneiden-den Komponenten ausrechnen. Schon für $g = 3$ ist dies aufwendig. Mit der Idee in Bemerkung 2 läßt sich ein direktes Verfahren angeben:

Sei $T_{\sigma} \cap T_{\sigma'} \neq \emptyset$, so wähle ein $x \in T_{\sigma} \cap T_{\sigma'}$ wie in Bemerkung 2. Die Gerüste im Quotientenschnittgraphen sind dann in den Kanten disjunkt, d.h., die F_g -Translate von $\tilde{F}_{\sigma}$ und $\tilde{F}_{\sigma'}$ haben keine gemeinsame Kante. Kontrahiere alle F_g -Translate von $\tilde{F}_{\sigma}$, so erhält man den Schnittgraphen $\tilde{G}_0$ zum allgemeinen Punkt in T_{σ} . Da dabei keine Kante von $\tilde{F}_{\sigma'}$ kontrahiert worden ist, bleibt dieser Bereich unverändert. Da das Bilden von Medianen mit Kontraktion verträglich ist, gilt:

$$\text{Bild}(\tilde{F}_{\sigma'}) = \tilde{F}_{\sigma}(\sigma') := \text{Teilbaum erzeugt von den Medianen aller Basiselemente von } \sigma' \text{ im Graphen } \tilde{G}_0$$

ist isomorph zu $\tilde{F}_{\sigma'}$. Insbesondere ist jeder Knoten von $\tilde{F}_{\sigma}(\sigma')$ Median von Basiselementen aus σ' . Weiter gilt:

Die Achse eines Elementes δ aus σ' verläuft per Definition durch $\tilde{F}_{\sigma}(\sigma')$. In dem Baum über x schiebt δ auf dieser Achse um eine Länge $l_x(\delta)$. Da σ' in x geometrische Basis ist, ist $l_x(\delta)$ um eins größer als die Anzahl der Kanten der Achse, die in $\tilde{F}_{\sigma'}$ liegen. Betrachte die beiden Kanten $\tilde{w}_{\delta}^+, \tilde{w}_{\delta}^-$ der Achse von δ , die nicht in $\tilde{F}_{\sigma'}$ liegen, die aber einen gemeinsamen Knoten mit $\tilde{F}_{\sigma'}$ haben. Die beiden Kanten sind vermöge δ äquivalent. Sind diese beiden Kanten F_g -Translate einer Kante in $\tilde{F}_{\sigma}$, so werden sie kontrahiert. Bezeichne $l_{\sigma}(\delta)$ die Verschiebungslänge von δ auf der Achse von δ in $\tilde{G}_0$, so ist die Anzahl der Kanten der Achse in $\tilde{F}_{\sigma}(\sigma')$ dann gleich $l_{\sigma}(\delta)$, ansonsten ist die Anzahl um eins kleiner. Da das Bild der Achse eines Elementes wieder die Achse des Elementes ist, erhält man folgenden ersten Test für den Schnitt:

Seien zwei Basen $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_g)$ und $\sigma' = (\delta_1, \dots, \delta_g)$ gegeben. Betrachte den Schnittgraphen $\tilde{G}_0$ des allgemeinen Punktes in T_σ und die F_g -Aktion auf diesem. Setze:

$$\tilde{F}_\sigma(\sigma') = \left\langle \bigcup_{\delta_i, \delta_j, \delta_k \in \sigma'} m(\delta_i, \delta_j, \delta_k) \right\rangle \subset \tilde{G}_0,$$

der von diesen Knoten erzeugte Teilbaum. Es muß dann gelten:

- (i) Jeder Knoten in $\tilde{F}_\sigma(\sigma')$ ist Median von Basiselementen.
- (ii) Zu jedem Basiselement δ von σ' betrachte die Kanten der Achse von δ , die in $\tilde{F}_\sigma(\sigma')$ liegen. Ihre Anzahl muß gleich oder um eins kleiner sein als $l_\sigma(\delta)$.

Ein notwendiges und hinreichendes Kriterium ergibt sich, wenn man aus $\tilde{F}_\sigma(\sigma')$ den Schnittgraphen G_x eines allgemeinen Punktes $x \in T_\sigma \cap T_{\sigma'}$ zurückgewinnen kann. Sei also ein allgemeiner Punkt $x \in T_\sigma \cap T_{\sigma'}$ gegeben. Aus $\tilde{F}_{\sigma'}$ läßt sich ein 2g-markierter stabiler Graph $(T, \psi) = (T_{\sigma'}(\sigma'), \psi_{\sigma'}(\sigma'))$ gewinnen, indem man die Fixpunkte von δ_i auf $\tilde{F}_{\sigma'}$ projiziert und als Marke i definiert. Nach Definition von $f_{\sigma'}$ ist dann $T_\sigma \cap T_{\sigma'} = f_{\sigma'}(B(T, \psi))$. Den Schnittgraphen G_x erhält man aus (T, ψ) , indem man jeweils den Knoten mit der Marke i mit dem Knoten mit der Marke $-i$ verbindet. Für G_x ist T ein Gerüst, und die Kontraktion von T induziert σ' . Da aber auch σ geometrische Basis und x ein allgemeiner Punkt in $T_\sigma \cap T_{\sigma'}$ ist, muß es ein zu T disjunktes Gerüst K geben, dessen Kontraktion σ ergibt. Die Kanten von K sind folgendermaßen charakterisiert:

Sei w eine Kante, die nicht in T liegt. w entstehe durch Verbinden der Marken i und $-i$. $\tilde{w}_{\delta_i}^+$ ist eine Liftung der Kante w nach $\tilde{G}_x$. w gehört zu K , genau dann, wenn $\tilde{w}_{\delta_i}^+$ F_g -äquivalent zu einer Kante aus $\tilde{F}_\sigma$ ist. Dies ist genau dann der Fall, wenn $\tilde{w}_{\delta_i}^+$ kontrahiert wird, d.h., wenn $l_\sigma(\delta_i)$ gleich der Anzahl der Kanten der Achse von δ in $\tilde{F}_\sigma(\sigma')$ ist. Ein notwendiges und hinreichendes Kriterium ist also gegeben durch:

Seien σ und σ' gegeben, und (i) und (ii) seien erfüllt. Betrachte den aus $\tilde{F}_\sigma(\sigma')$ entstehenden markierten Graphen $(T_\sigma(\sigma'), \psi_\sigma(\sigma'))$. Dieser induziert einen Graphen $G_\sigma(\sigma')$ vom Geschlecht g , in dem T ein Gerüst ist. Betrachte

die Kanten w_i , die durch Verbinden der Marken i und $-i$ entstehen. Wähle die Kanten w_i aus, für die $l_\sigma(\delta_i)$ gleich der Anzahl der Kanten der Achse von δ_i , die in $\tilde{F}_\sigma(\sigma')$ liegen, ist. Die Vereinigung dieser Kanten sei $K_\sigma(\sigma')$. Es ist dann:

$T_\sigma \cap T_{\sigma'} \neq \emptyset \Leftrightarrow K$ ist ein Gerüst und Kontraktion von K induziert σ .

Nach Folgerung 2 aus Satz 2.1 ist diese Bedingung hinreichend.

Bsp.:

a) $g=2$, $\sigma = (\gamma_1, \gamma_2)$, $\sigma' = (\gamma_1^2 \gamma_2, \gamma_2)$

Bild:

Achse von γ_2





$\tilde{F}_\sigma(\sigma') = \text{---} \circ \text{---} \bullet \text{---} \circ \text{---}$, der mittlere Knoten ist nicht Median.

$T_\sigma \cap T_{\sigma'} = \emptyset$

b) $g=3$, $\sigma = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$, $\sigma' = (\gamma_2 \gamma_1, \gamma_3 \gamma_2, \gamma_3)$

Bild





Jeder Knoten ist Median, aber die Achse von $\gamma_2 \gamma_1$ hat mit $\tilde{F}_\sigma(\sigma')$ keine gemeinsame Kante, obwohl $l_\sigma(\gamma_2 \gamma_1) = 2$ ist.

$T_\sigma \cap T_{\sigma'} = \emptyset$

c) $g=3$, $\sigma = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$, $\sigma' = (\gamma_1, \gamma_2\gamma_1, \gamma_3\gamma_1)$

Bild



Jeder Knoten ist Median.

Die Achse von γ_1 schneidet $\tilde{F}_\sigma(\sigma')$ in 1 Kante und schiebt um 1.


Die Achse von $\gamma_2\gamma_1$ schneidet $\tilde{F}_\sigma(\sigma')$ in 1 Kante und schiebt um 2.

Die Achse von $\gamma_3\gamma_1$ schneidet $\tilde{F}_\sigma(\sigma')$ in 1 Kante und schiebt um 2.

Der markierte Baum $(T_\sigma(\sigma'), \psi_\sigma(\sigma'))$ hat die Form:



$G_\sigma(\sigma')$ ist also von der Form:



Die Kanten 2 und 3 gehören nicht zum Gerüst K . Die Kante 1 ist das Gerüst K , und K induziert die Basis σ .

$T_\sigma \cap T_{\sigma'} = f_{\sigma'}(B(T_\sigma(\sigma'), \psi_\sigma(\sigma'))) \neq \emptyset$, $\dim(T_\sigma \cap T_{\sigma'}) = 2$.

§4 Der Komplex von Culler-Vogtmann

In diesem Paragraphen soll der Zusammenhang zu dem Komplex K_g von Culler-Vogtmann, wie in [CV] konstruiert, erläutert werden. Die kombinatorische Struktur dieses Komplexes ist die gleiche wie für T_g^d . Sie zeigen, daß K_g kontrahierbar ist, woraus gefolgert werden kann, daß T_g^d einfach zusammenhängend ist. Der Komplex K_g klassifiziert folgende Objekte:

Def.1: Fixiere den Graphen G_0 mit einem Knoten und g Schleifen. Wähle einen festen Isomorphismus $\pi_1(G_0) \approx F_g$. Sei G ein $\mathbb{R}$ -Graph, so heißt eine Homotopie

$$h : G_0 \rightarrow G$$

eine Markierung von G . Zwei Markierungen

$$h_1 : G_0 \rightarrow G_1, h_2 : G_0 \rightarrow G_2$$

heißen äquivalent, wenn es eine Isometrie

$$i : G_1 \rightarrow G_2$$

gibt, so daß $h_1 \circ i$ bis auf freie Homotopie gleich h_2 ist. Eine Äquivalenzklasse von Markierungen heißt ein markierter Graph (G, h) .

Bem.1: Die Markierung h induziert zusammen mit der Wahl des festen Isomorphismus $\pi_1(G_0) \approx F_g$ eine Basis von $\pi_1(G)$. Ein markierter Graph ist also gegeben durch die Länge seiner Kanten und die Wahl einer Basis seiner Fundamentalgruppe (bis auf Konjugation, da freie Homotopie erlaubt ist).

Ein markierter Graph (G, h) induziert eine Längenfunktion auf F_g . Für ein Wort $w \in \pi_1(G_0)$ sei $l(w)$ gleich der Länge des kürzesten Weges in der Homotopieklasse von $\pi_1(h)[w] \in \pi_1(G)$. l ist dann eine Funktion auf den Konjugationsklassen von F_g . Mit Hilfe dieser Längenfunktionen läßt sich der Raum K_g definieren.

Def.2: Sei $\mathcal{K}$ die Menge der Konjugationsklassen in F_g . Ein markierter Graph läßt sich vermöge

$$(G, h) \longmapsto \left(l(h(w)) \right)_{[w] \in \mathcal{K}} \in \mathbb{R}^{\mathcal{K}}$$

nach $\mathbb{R}^K$ abbilden. Die Menge der Bilder sei $\tilde{K}_g$. Betrachtet man nur markierte Graphen, bei denen die Summe der Längen aller Kanten gleich 1 ist, so sind diese Graphen durch das Bild von $\tilde{K}_g$ in $\mathbb{P}(\mathbb{R}^K)$ klassifiziert. Das Bild heie K_g .

Satz1: K_g ist kontrahierbar.

Bew.: [CV], Seite 93

Bem.2: Dieses Ergebnis allein reicht noch nicht aus. Die Idee des Beweises soll im weiteren erläutert werden (siehe [CV], Seite 95–97). Die Autoren unterteilen den Komplex K_g in Teile K_σ , wobei σ die gleiche Menge durchläuft wie für die T_σ . Für eine Basis σ sei K_σ die Menge der markierten Graphen (G, h) , für die es eine Kontraktion k von G nach G_0 gibt, so daß

$$k \circ h : G_0 \longmapsto G_0$$

die Basis σ induziert. Es ist dann

$$K_g = \bigcup_{\sigma} K_{\sigma}$$

Im Beweis wird die Menge der Basen σ so nummeriert, daß

$$\left(\bigcup_{i=1}^n K_{\sigma_i} \right) \cap K_{\sigma_{n+1}}$$

kontrahierbar ist ([CV], Seite 115–118). Da jedes K_σ kontrahierbar ist, folgt, daß K_g kontrahierbar ist. Nach Konstruktion gilt nun:

Lemma1: $K_\sigma \cap K_{\sigma'} = \emptyset \Leftrightarrow T_\sigma \cap T_{\sigma'} = \emptyset$

Mithilfe einer speziellen Version des van Kampen-Theorems ermöglicht dies den Beweis des einfachen Zusammenhanges von T_g^d .

Satz2: Sei A ein separabler, regulärer topologischer Raum.

$A = C_1 \cup C_2$; C_1 und C_2 abgeschlossen; $B = C_1 \cap C_2$.

C_1 und C_2 seien 0-,1-,2-zusammenhängend.

B sei 0,1-zusammenhängend und wegweise zusammenhängend.
Es gilt dann:

Die Fundamentalgruppe von A wird von den Fundamentalgruppen von C_1 und C_2 erzeugt. Insbesondere ist A einfach zusammenhängend, wenn C_1 und C_2 es sind.

Bew.: Der Beweis einer schärferen Aussage ist zu finden in [K], Seite 267 (Korollar 2).

Bem.3: Da die T_σ Mannigfaltigkeiten sind, sind die Voraussetzungen von Satz2 erfüllt, d.h., falls

$$\left(\bigcup_{i=1}^n T_{\sigma_i} \right) \cap T_{\sigma_n}$$

zusammenhängend ist, ist T_g^d einfach zusammenhängend.

Lemma2: $\left(\bigcup_{i=1}^{n-1} T_{\sigma_i} \right) \cap T_{\sigma_n}$ ist wegweise zusammenhängend.

Bew.: Setze

$$\tilde{T}_{\sigma_n} = \bigcup_{i=1}^{n-1} T_{\sigma_i} \text{ und } T_{\sigma, \sigma'} = T_\sigma \cap T_{\sigma'}$$

Es ist dann

$$\tilde{T}_{\sigma_n} \cap T_{\sigma_n} = \bigcup_{i=1}^{n-1} T_{\sigma_n, \sigma_i}$$

Mit analogen Definitionen gilt:

$$\tilde{K}_{\sigma_n} \cap K_{\sigma_n} = \bigcup_{i=1}^{n-1} K_{\sigma_n, \sigma_i}$$

und diese Menge ist wegweise zusammenhängend.

Für $i_1, i_2 < n$ gibt es also einen Weg w von $K_{\sigma_n, \sigma_{i_1}}$ nach $K_{\sigma_n, \sigma_{i_2}}$. Wähle eine Kette $\sigma_{j_1}, \dots, \sigma_{j_r}$, so daß w sich unterteilen läßt in Stücke $w_1, \dots, w_r$ mit $w_k \subset K_{\sigma_n, \sigma_{j_k}}$. Es folgt, daß

$$K_{\sigma_{j_k}} \cap K_{\sigma_{j_{k+1}}} \neq \emptyset \quad \forall k = 1, \dots, r-1$$

ist. Nach Lemma 1 ist dann

$$T_{\sigma_{j_k}} \cap T_{\sigma_{j_{k+1}}} \neq \emptyset$$

Da $w \subset K_{\sigma_n}$ ist, ist auch

$$K_{\sigma_n} \cap K_{\sigma_{j_k}} \neq \emptyset \quad \forall k \Rightarrow T_{\sigma_n} \cap T_{\sigma_{j_k}} \neq \emptyset$$

Nach Bem. 3.3 ist also

$$T_{\sigma_{j_k}} \cap T_{\sigma_{j_{k+1}}} \cap T_{\sigma_n} \neq \emptyset$$

Es gibt also einen Weg von $T_{\sigma_n, \sigma_{j_k}}$ nach $T_{\sigma_n, \sigma_{j_{k+1}}}$. Es folgt, daß es einen Weg von $T_{\sigma_n, \sigma_{i_1}}$ nach $T_{\sigma_n, \sigma_{i_2}}$ in $\tilde{T}_{\sigma_n} \cap T_{\sigma_n}$ gibt, d.h., $\tilde{T}_{\sigma_n} \cap T_{\sigma_n}$ ist wegweise zusammenhängend.

Satz 3: T_g^d ist einfach zusammenhängend.

Bew.: Mit Induktion über n beweise, daß $\tilde{T}_{\sigma_n}$ einfach zusammenhängend ist. Da jedes T_σ nur endlich viele andere $T_{\sigma'}$ schneidet, kann jeder Weg nur endlich viele T_σ schneiden. Es folgt die Behauptung.

$n=1$: T_σ ist isomorph zu B_{2g} , also nach Satz 1.2 birational zu P_1^{2g-3} . Es folgt (siehe [HK], Seite 252), daß die Fundamentalgruppe von T_σ gleich der von P_1^{2g-3} , also trivial ist.

$n>1$: $\tilde{T}_{\sigma_n}$ ist nach Induktionsvoraussetzung einfach zusammenhängend. T_{σ_n} ist ebenfalls einfach zusammenhängend. Nach Lemma 2 ist $\tilde{T}_{\sigma_n} \cap T_{\sigma_n}$ wegweise zusammenhängend. Nach Satz 2 ist dann $\tilde{T}_{\sigma_n} \cup T_{\sigma_n}$ einfach zusammenhängend.

Folg.: $T_g^d / \text{Aut}(F_g) = \text{Modulraum für total degenerierte Kurven}$ ist einfach zusammenhängend.

Bew.: $\text{Aut}(F_g)$ wird erzeugt von Vertauschungen der Basiselemente und von


$$\gamma_i \mapsto \gamma_j^{-1} \gamma_i$$

oder

$$\gamma_i \mapsto \gamma_i^{-1}$$

wobei jeweils alle anderen Basiselemente festgehalten werden (siehe [H], Seite 192). Damit läßt sich zeigen, daß $\text{Aut}(F_g)$ von Elementen mit Fixpunkten erzeugt wird:

Das Vertauschen und Invertieren von Basiselementen hält die Komponente zu $\sigma = (\gamma_1, \dots, \gamma_g)$ fest, d.h., man kann sich auf die Betrachtung von B_{2g} beschränken. Sei $\mathbb{C} i = 1, j = 2$. Beide Operationen haben einen gemeinsamen Fixpunkt, nämlich den markierten Baum:




Der dritte Automorphismus ist nicht so leicht zu behandeln. Betrachte statt des angegebenen Automorphismus den Automorphismus:

$$\begin{aligned}\gamma_1 &\xrightarrow{\phi} \gamma_2 \gamma_1^{-1} \\ \gamma_2 &\xrightarrow{\phi} \gamma_1^{-1}\end{aligned}$$

Dieser ist von Ordnung 3. In der Komponente zu $\sigma = (\gamma_1, \dots, \gamma_g)$ gibt es einen Fixpunkt p . Er muß die Gleichungen

$$\lambda_{st(\nu_1), \dots, st(\nu_4)} = \lambda_{st(\mu\phi(\nu_1)\mu^{-1}), \dots, st(\mu\phi(\nu_4)\mu^{-1})}$$

erfüllen. Durch eine längere, aber leichte Rechnung bekommt man die kombinatorische Gestalt von p . Der markierte Baum zu p hat die Gestalt:



Die einzige Gleichung, die nicht durch die kombinatorische Struktur erfüllt wird, ist die Gleichung:

$$\begin{aligned}\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_1^{-1}, \gamma_i} &= \lambda_{\gamma_2 \gamma_1^{-1}, \gamma_1^{-1}, \gamma_1 \gamma_2^{-1}, \gamma_i} \\ &= \lambda_{\gamma_2, \gamma_1^{-1}, \gamma_1, \gamma_i} \\ &= \frac{1}{1 - \lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_1^{-1}, \gamma_i}}\end{aligned}$$

Diese Gleichung hat die Lösung $-\xi$, wobei ξ eine dritte Einheitswurzel ist. Das Vertauschen von 1, 2, -1 auf L darf das Doppelverhältnis der drei Markierungen mit einer Markierung aus dem Rest nicht ändern. Normiert man die drei Markierungen 1, 2, -1 auf L nicht durch 0, ∞ , 1, sondern durch 1, ξ , ξ^2 , so geht $-\xi$ nach 0. Man sieht, daß das Vertauschen der drei Marken dann den Punkt 0 festhält. p ist dann Fixpunkt von ϕ . Mithilfe von Lemma3 folgt dann die Behauptung.


Lemma3: X sei ein einfach zusammenhängender topologischer Raum, und G operiere diskontinuierlich auf X . Zu jedem Weg $w : [0, 1] \rightarrow X/G$ gebe es einen Weg $\tilde{w} : [0, 1] \rightarrow X$, so daß $\pi \circ \tilde{w}$ homotop zu w ist ($\pi : X \rightarrow X/G$). G werde von Elementen erzeugt, die auf X einen Fixpunkt haben, dann ist X/G einfach zusammenhängend.

Bew.: [G], Seite 54


Die Aktion von $\text{Aut}(F_g)$ auf T_g^d ist diskontinuierlich, da es stets nur endlich viele ϕ in $\text{Aut}(F_g)$ gibt mit $\phi(T_\sigma) \cap T_\sigma \neq \emptyset$.

§5 Spezialfall $g=2$ und $g=3$ **A** $g=2$

Für $g=2$ ist die Situation sehr einfach. Jedes T_σ ($\sigma = (\gamma_1, \gamma_2)$) ist isomorph zu B_4 , also isomorph zu P_1 . Die Koordinate $\lambda_{\gamma_1, \gamma_2, \gamma_1^{-1}, \gamma_2^{-1}}$ ist eine Koordinate für den P_1 . Der Punkt 1 entspricht dem markierten Baum:




Die Punkte 0 und ∞ entsprechen den markierten Bäumen:



In diesen beiden Punkten wird T_σ von anderen Komponenten geschnitten. Um dies zu berechnen, betrachte man alle stabilen Graphen vom Geschlecht 2. Dies sind folgende:



I




II



III

(I) gehört zum allgemeinen Punkt in T_σ , (II) entspricht dem Punkt 1, und (III) gehört zu den Punkten 0 und ∞ . Wie man sieht, läßt nur der Graph (III) disjunkte Gerüste zu. Man hat also folgende Situation:



Die Kante 1 sei das Gerüst zu $\sigma = (\gamma_1, \gamma_2)$. Die Kante 2 das Gerüst zu $\sigma' = (\delta_1, \delta_2)$. p sei der Aufpunkt. Die Elemente γ_i, δ_i seien durch die Wege gegeben, die in p beginnen und durch das jeweilige Gerüst und die Kante γ_i bzw. δ_i in der angegebenen Richtung verlaufen. Man rechnet nach, daß dann

$$(\delta_1, \delta_2) = (\gamma_1, \gamma_1^{-1} \gamma_2)$$


ist. Durch Vertauschen von 1 und 2, sowie durch Inversenbildung bei γ_1 oder γ_2 erhält man 7 weitere Möglichkeiten für die Basis (δ_1, δ_2) . Diese sind:

$$(\gamma_1^{-1}, \gamma_1 \gamma_2), (\gamma_1, \gamma_1^{-1} \gamma_2^{-1}), (\gamma_1^{-1}, \gamma_1 \gamma_2^{-1}), (\gamma_2, \gamma_2^{-1} \gamma_1), \\ (\gamma_2^{-1}, \gamma_2 \gamma_1), (\gamma_2, \gamma_2^{-1} \gamma_1^{-1}), (\gamma_2^{-1}, \gamma_2 \gamma_1^{-1}).$$

Je zwei davon gehören zum gleichen $T_{\sigma'}$ (z.B. unterscheidet sich $(\gamma_1, \gamma_1 \gamma_2^{-1})$ nur um Konjugation mit γ_1 und um Inversenbildung von $(\gamma_1^{-1}, \gamma_1 \gamma_2^{-1})$). Man erhält vier Komponenten $T_{\sigma'}$, die T_{σ} schneiden. Die dazugehörigen Basen sind (in anderer Form):

$$(\gamma_1, \gamma_1^{-1} \gamma_2), (\gamma_1, \gamma_1 \gamma_2), (\gamma_2, \gamma_1^{-1} \gamma_2), (\gamma_2, \gamma_1 \gamma_2)$$


Man sieht leicht, daß die Komponenten zu den beiden ersten Basen T_{σ} in 0, die zu den beiden letzten T_{σ} in ∞ schneiden. Lokal ergibt sich also folgendes Bild:



Man kann nun leicht nachweisen, daß die Summe der Wortlängen der beiden Basiselemente bei Komponenten, die von T_σ weiter entfernt sind, größer ist als bei näheren. Dies zeigt, daß T_2^d einfach zusammenhängend ist.

$\mathcal{B}$ $g=3$


Für $g=3$ ist die Situation schon erheblich komplizierter. Jedes T_σ ist isomorph zu B_6 . Um die schneidenden Komponenten zu berechnen, betrachte wieder alle stabilen Graphen vom Geschlecht 3. Dies sind:



In diesen Graphen müssen nun disjunkte Gerüstpaare gesucht werden. Dabei ergibt die Vertauschung der beiden Gerüste einen neuen Fall. Die


Gerüstepaare sind jedoch nur modulo Automorphismen der Graphen zu betrachten. Die Graphen IV, VIII, IX, X, XIII, XIV, XV lassen keine disjunkten Gerüste zu, da sie Brücken enthalten. Es bleiben die sieben Graphen II, III, V, VI, VII, XI, XII. Bis auf den Graphen VI, der drei verschiedene Gerüstepaare zuläßt, hat jeder Graph nur ein Gerüstepaar. Bei VI tritt auch der Fall auf, daß durch Vertauschen der beiden Gerüste ein nicht isomorphes Paar entsteht. Mit den Bezeichnungen wie für $g=2$ ergeben sich folgende 9 Fälle:

a)




$$(\delta_1, \delta_2, \delta_3) = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_2 \gamma_3 \gamma_2^{-1})$$

b)




$$(\delta_1, \delta_2, \delta_3) = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \gamma_2^{-1})$$

c)




$$(\delta_1, \delta_2, \delta_3) = (\gamma_1, \gamma_2 \gamma_1^{-1}, \gamma_3 \gamma_1^{-1})$$

d)



$$(\delta_1, \delta_2, \delta_3) = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_1^{-1} \gamma_3 \gamma_2)$$

e+f)




$$(\delta_1, \delta_2, \delta_3) = (\gamma_1, \gamma_2^{-1} \gamma_1^{-1}, \gamma_3 \gamma_2)$$

Das Vertauschen der Gerüste ergibt in diesem Fall kein isomorphes Paar. Man erhält die Darstellung:

$$(\delta_1, \delta_2, \delta_3) = (\gamma_1, \gamma_1^{-1} \gamma_2^{-1}, \gamma_3 \gamma_2 \gamma_1)$$


(Dies ist die Darstellung der γ_i in den δ_j bzgl. der obigen Gleichung.)

g)




$$(\delta_1, \delta_2, \delta_3) = (\gamma_1, \gamma_3^{-1} \gamma_2 \gamma_3, \gamma_3^{-1} \gamma_2)$$

h)



$$(\delta_1, \delta_2, \delta_3) = (\gamma_1, \gamma_3 \gamma_2 \gamma_1, \gamma_1^{-1} \gamma_2^{-1} \gamma_3^{-1} \gamma_2 \gamma_1)$$

i)



$$(\delta_1, \delta_2, \delta_3) = (\gamma_3 \gamma_2, \gamma_2^{-1} \gamma_3^{-1} \gamma_1, \gamma_2^{-1} \gamma_1)$$

Durch Vertauschen und Inversenbildung ergeben sich weitere Basen. Diese neun Basen haben in normierter Form (siehe § 6) die Gestalt:

- a) (γ_1 , γ_3 , $\gamma_1\gamma_2\gamma_1^{-1}$) : 6 Komponenten
- b) (γ_1 , γ_3 , $\gamma_2\gamma_1$) : 24 Komponenten
- c) (γ_1 , $\gamma_1\gamma_2$, $\gamma_1\gamma_3$) : 12 Komponenten
- d) (γ_1 , γ_2 , $\gamma_2\gamma_3\gamma_1$) : 24 Komponenten
- e) (γ_1 , $\gamma_3\gamma_1$, $\gamma_3\gamma_2$) : 48 Komponenten
- f) (γ_1 , $\gamma_1\gamma_2$, $\gamma_1\gamma_2\gamma_3$) : 48 Komponenten
- g) (γ_1 , $\gamma_2\gamma_3$, $\gamma_2\gamma_3\gamma_2^{-1}$) : 24 Komponenten
- h) (γ_1 , $\gamma_3\gamma_2\gamma_1$, $\gamma_3\gamma_2\gamma_3^{-1}$) : 24 Komponenten
- i) ($\gamma_2\gamma_1$, $\gamma_2\gamma_3$, $\gamma_2\gamma_3\gamma_1$) : 24 Komponenten

Insgesamt hat man 234 Komponenten.

Als letztes stellt sich nun die Frage, wie sich diese Komponenten untereinander schneiden. Dies wird in einem Anhang aufgelistet. Hier eine Tabelle, die angibt, wieviele Komponenten vom Typ x eine Komponente vom Typ y schneidet:

y^x	a	b	c	d	e	f	g	h	i	gesamt
a	0	8	8	4	4	4	0	0	0	28
b	2	11	12	6	6	4	4	6	16	67
c	1	6	5	3	2	1	1	3	4	26
d	1	6	6	2	2	1	1	3	4	26
e	1	6	4	2	2	2	0	0	0	17
f	1	4	2	1	2	0	0	0	0	10
g	0	4	2	1	0	0	0	3	4	14
h	0	12	12	6	0	0	6	2	12	50
i	0	8	4	2	0	0	2	3	7	26

§6 Anhang

Aus den Basen für die neun Grundtypen, die für $g=3$ in §5 errechnet wurden, lassen sich nun alle schneidenden Komponenten errechnen. Durch Vertauschen der Indizes 1, 2, 3 und durch Inversenbildung der einzelnen Basiselemente lassen sich $48 = 6 \cdot 2^3$ Basen vom gleichen Typ errechnen, so daß die entsprechenden Komponenten das feste T_σ ($\sigma = (\gamma_1, \gamma_1, \gamma_3)$) schneiden. Diese 48 Komponenten müssen nicht notwendig verschieden sein. Es kommt vor, daß einige der 48 entstehenden Basen sich nur um Inversenbildung oder Reihenfolge unterscheiden. Um dies mit einem Computerprogramm berechnen zu können, wurde jede Basis $\sigma' = (\delta_1, \delta_2, \delta_3)$ in eine eindeutig bestimmte Form gebracht. Zuerst wird getestet, ob durch Konjugation der Basis die Summe der Längen der Basiselemente verkürzt werden kann. Falls die Summe minimal ist, kann es noch ein Basiselement γ_i von σ geben, so daß nach Konjugation von σ' mit γ_i die Summe der Längen der Basiselemente gleichbleibt. In diesem Fall wird mit γ_i konjugiert, falls $i > 0$ ist. Die Menge $\{\delta_1, \delta_1^{-1}, \delta_2, \delta_2^{-1}, \delta_3, \delta_3^{-1}\}$ ist dann eindeutig bestimmt. Durch die Darstellung eines Elementes γ in σ erhält man eine lexikographische Ordnung auf F_g bzgl. der Ordnung $\gamma_3^{-1} < \gamma_2^{-1} < \gamma_1^{-1} < \gamma_1 < \gamma_2 < \gamma_3$. Wähle aus jedem Paar $(\delta_i, \delta_i^{-1})$ das größere aus. Dies sei δ_i . Ordnet man $\delta_1, \delta_2, \delta_3$ der Größe nach an, so erhält man eine eindeutige Darstellung der Basis σ' . Das Programm erzeugt also die 48 Basen, normiert diese und entfernt doppelte. Auf diese Weise erhält man die 234 Komponenten $T_{\sigma'}$.

Die nächste Frage ist, wie sich diese 234 Komponenten schneiden. Dies wurde wieder von einem Programm überprüft. Das Programm errechnet alle Komponenten $T_{\sigma''}$, die ein festes $T_{\sigma'}$ schneiden, normiert diese bzgl. σ und vergleicht sie mit den vorhandenen $T_{\sigma'}$. Man erhält eine vollständige Tabelle des Schnittverhaltens. Auf den nächsten Seiten werden diese Ergebnisse aufgelistet. Es werden zuerst die Basen, die sich aus den Grundtypen errechnen, aufgelistet und nummeriert. In den nachfolgenden Tabellen wird das Schnittverhalten aufgelistet. Leere Felder bedeuten keinen Schnitt. Die Zahlen geben an, von welchem Typ die Komponente $T_{\sigma''}$ in Bezug auf die Komponente $T_{\sigma'}$ ist. Insbesondere läßt sich die Dimension des Durchschnitts ermitteln.

- 1: $(\gamma_1, \gamma_3, \gamma_1\gamma_2\gamma_1^{-1})$
- 2: $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_1\gamma_3\gamma_1^{-1})$
- 3: $(\gamma_2, \gamma_3, \gamma_2\gamma_1\gamma_2^{-1})$
- 4: $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_2\gamma_3\gamma_2^{-1})$
- 5: $(\gamma_2, \gamma_3, \gamma_3\gamma_1\gamma_3^{-1})$
- 6: $(\gamma_1, \gamma_3, \gamma_3\gamma_2\gamma_3^{-1})$
- 7: $(\gamma_1, \gamma_3, \gamma_2\gamma_1)$
- 8: $(\gamma_1, \gamma_3, \gamma_1^{-1}\gamma_2)$
- 9: $(\gamma_1, \gamma_3, \gamma_2\gamma_1^{-1})$
- 10: $(\gamma_1, \gamma_3, \gamma_1\gamma_2)$
- 11: $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3\gamma_1)$
- 12: $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_1^{-1}\gamma_3)$
- 13: $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3\gamma_1^{-1})$
- 14: $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_1\gamma_3)$
- 15: $(\gamma_2, \gamma_3, \gamma_1\gamma_2)$
- 16: $(\gamma_2, \gamma_3, \gamma_2\gamma_1^{-1})$
- 17: $(\gamma_2, \gamma_3, \gamma_1^{-1}\gamma_2)$
- 18: $(\gamma_2, \gamma_3, \gamma_2\gamma_1)$
- 19: $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3\gamma_2)$
- 20: $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_2^{-1}\gamma_3)$
- 21: $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3\gamma_2^{-1})$
- 22: $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_2\gamma_3)$
- 23: $(\gamma_2, \gamma_3, \gamma_1\gamma_3)$
- 24: $(\gamma_2, \gamma_3, \gamma_3\gamma_1^{-1})$
- 25: $(\gamma_2, \gamma_3, \gamma_1^{-1}\gamma_3)$
- 26: $(\gamma_2, \gamma_3, \gamma_3\gamma_1)$
- 27: $(\gamma_1, \gamma_3, \gamma_2\gamma_3)$
- 28: $(\gamma_1, \gamma_3, \gamma_3\gamma_2^{-1})$
- 29: $(\gamma_1, \gamma_3, \gamma_2^{-1}\gamma_3)$
- 30: $(\gamma_1, \gamma_3, \gamma_3\gamma_2)$
- 31: $(\gamma_1, \gamma_1\gamma_2, \gamma_1\gamma_2\gamma_3)$
- 32: $(\gamma_1, \gamma_1\gamma_2, \gamma_3\gamma_2^{-1}\gamma_1^{-1})$
- 33: $(\gamma_1, \gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_1\gamma_2^{-1}\gamma_3)$
- 34: $(\gamma_1, \gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_2\gamma_1^{-1})$
- 35: $(\gamma_1, \gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_2\gamma_3\gamma_1^{-1})$
- 36: $(\gamma_1, \gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_2\gamma_3^{-1}\gamma_1^{-1})$
- 37: $(\gamma_1, \gamma_1\gamma_2, \gamma_1\gamma_3^{-1}\gamma_2)$
- 38: $(\gamma_1, \gamma_1\gamma_2, \gamma_1\gamma_3\gamma_2)$
- 39: $(\gamma_1, \gamma_1\gamma_3, \gamma_1\gamma_3\gamma_2)$
- 40: $(\gamma_1, \gamma_3\gamma_1^{-1}, \gamma_1\gamma_3^{-1}\gamma_2)$
- 41: $(\gamma_1, \gamma_1\gamma_3, \gamma_2\gamma_3^{-1}\gamma_1^{-1})$
- 42: $(\gamma_1, \gamma_3\gamma_1^{-1}, \gamma_2\gamma_3\gamma_1^{-1})$
- 43: $(\gamma_1, \gamma_3\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_2\gamma_1^{-1})$
- 44: $(\gamma_1, \gamma_1\gamma_3, \gamma_1\gamma_2^{-1}\gamma_3)$
- 45: $(\gamma_1, \gamma_3\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_2^{-1}\gamma_1^{-1})$
- 46: $(\gamma_1, \gamma_1\gamma_3, \gamma_1\gamma_2\gamma_3)$
- 47: $(\gamma_2, \gamma_2\gamma_1, \gamma_2\gamma_1\gamma_3)$
- 48: $(\gamma_2, \gamma_2\gamma_1, \gamma_3\gamma_1^{-1}\gamma_2^{-1})$
- 49: $(\gamma_2, \gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_2\gamma_3^{-1}\gamma_1^{-1})$
- 50: $(\gamma_2, \gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_2\gamma_3\gamma_1^{-1})$
- 51: $(\gamma_2, \gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_2\gamma_1^{-1}\gamma_3)$
- 52: $(\gamma_2, \gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_1\gamma_2^{-1})$
- 53: $(\gamma_2, \gamma_2\gamma_1, \gamma_2\gamma_3^{-1}\gamma_1)$
- 54: $(\gamma_2, \gamma_2\gamma_1, \gamma_2\gamma_3\gamma_1)$
- 55: $(\gamma_2, \gamma_2\gamma_3, \gamma_2\gamma_3\gamma_1)$
- 56: $(\gamma_2, \gamma_3\gamma_2^{-1}, \gamma_2\gamma_3^{-1}\gamma_1)$
- 57: $(\gamma_2, \gamma_3\gamma_2^{-1}, \gamma_3\gamma_1\gamma_2^{-1})$
- 58: $(\gamma_2, \gamma_2\gamma_3, \gamma_2\gamma_1^{-1}\gamma_3)$
- 59: $(\gamma_2, \gamma_2\gamma_3, \gamma_2\gamma_3\gamma_1^{-1})$
- 60: $(\gamma_2, \gamma_3\gamma_2^{-1}, \gamma_2\gamma_3^{-1}\gamma_1^{-1})$
- 61: $(\gamma_2, \gamma_3\gamma_2^{-1}, \gamma_3\gamma_1^{-1}\gamma_2^{-1})$
- 62: $(\gamma_2, \gamma_2\gamma_3, \gamma_2\gamma_1\gamma_3)$
- 63: $(\gamma_3, \gamma_3\gamma_1, \gamma_3\gamma_1\gamma_2)$
- 64: $(\gamma_3, \gamma_3\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_2^{-1}\gamma_1^{-1})$
- 65: $(\gamma_3, \gamma_3\gamma_1, \gamma_3\gamma_1\gamma_2^{-1})$
- 66: $(\gamma_3, \gamma_3\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_2\gamma_1^{-1})$
- 67: $(\gamma_3, \gamma_3\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_1^{-1}\gamma_2)$
- 68: $(\gamma_3, \gamma_3\gamma_1, \gamma_3\gamma_2^{-1}\gamma_1)$
- 69: $(\gamma_3, \gamma_3\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_1^{-1}\gamma_2^{-1})$
- 70: $(\gamma_3, \gamma_3\gamma_1, \gamma_3\gamma_2\gamma_1)$
- 71: $(\gamma_3, \gamma_3\gamma_2, \gamma_3\gamma_2\gamma_1)$
- 72: $(\gamma_3, \gamma_3\gamma_2^{-1}, \gamma_3\gamma_1^{-1}\gamma_2^{-1})$
- 73: $(\gamma_3, \gamma_3\gamma_2^{-1}, \gamma_3\gamma_2^{-1}\gamma_1)$
- 74: $(\gamma_3, \gamma_3\gamma_2, \gamma_3\gamma_1^{-1}\gamma_2)$
- 75: $(\gamma_3, \gamma_3\gamma_2, \gamma_3\gamma_2\gamma_1^{-1})$
- 76: $(\gamma_3, \gamma_3\gamma_2^{-1}, \gamma_3\gamma_1\gamma_2^{-1})$
- 77: $(\gamma_3, \gamma_3\gamma_2^{-1}, \gamma_3\gamma_2^{-1}\gamma_1^{-1})$
- 78: $(\gamma_3, \gamma_3\gamma_2, \gamma_3\gamma_1\gamma_2)$
- 79: $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_2\gamma_3\gamma_1)$
- 80: $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_2\gamma_3^{-1}\gamma_1)$
- 81: $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_1^{-1}\gamma_3^{-1}\gamma_2)$
- 82: $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_1^{-1}\gamma_3\gamma_2)$
- 83: $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_2\gamma_3\gamma_1^{-1})$
- 84: $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_2\gamma_3^{-1}\gamma_1^{-1})$
- 85: $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_1\gamma_3^{-1}\gamma_2)$
- 86: $(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_1\gamma_3\gamma_2)$
- 87: $(\gamma_1, \gamma_3, \gamma_3\gamma_2\gamma_1)$
- 88: $(\gamma_1, \gamma_3, \gamma_1^{-1}\gamma_2^{-1}\gamma_3)$
- 89: $(\gamma_1, \gamma_3, \gamma_3\gamma_2^{-1}\gamma_1)$
- 90: $(\gamma_1, \gamma_3, \gamma_1^{-1}\gamma_2\gamma_3)$
- 91: $(\gamma_1, \gamma_3, \gamma_3\gamma_2\gamma_1^{-1})$
- 92: $(\gamma_1, \gamma_3, \gamma_1\gamma_2^{-1}\gamma_3)$
- 93: $(\gamma_1, \gamma_3, \gamma_3\gamma_2^{-1}\gamma_1^{-1})$
- 94: $(\gamma_1, \gamma_3, \gamma_1\gamma_2\gamma_3)$
- 95: $(\gamma_2, \gamma_3, \gamma_3\gamma_1\gamma_2)$
- 96: $(\gamma_2, \gamma_3, \gamma_2^{-1}\gamma_1^{-1}\gamma_3)$
- 97: $(\gamma_2, \gamma_3, \gamma_3\gamma_1\gamma_2^{-1})$
- 98: $(\gamma_2, \gamma_3, \gamma_2\gamma_1^{-1}\gamma_3)$
- 99: $(\gamma_2, \gamma_3, \gamma_3\gamma_1^{-1}\gamma_2)$
- 100: $(\gamma_2, \gamma_3, \gamma_2^{-1}\gamma_1\gamma_3)$
- 101: $(\gamma_2, \gamma_3, \gamma_3\gamma_1^{-1}\gamma_2^{-1})$
- 102: $(\gamma_2, \gamma_3, \gamma_2\gamma_1\gamma_3)$
- 103: $(\gamma_1, \gamma_2\gamma_3, \gamma_2\gamma_3\gamma_2^{-1})$
- 104: $(\gamma_1, \gamma_3\gamma_2^{-1}, \gamma_2\gamma_3\gamma_2^{-1})$
- 105: $(\gamma_3, \gamma_3\gamma_2^{-1}, \gamma_2\gamma_1\gamma_2^{-1})$
- 106: $(\gamma_3, \gamma_2\gamma_1, \gamma_2\gamma_1\gamma_2^{-1})$
- 107: $(\gamma_1, \gamma_3\gamma_2, \gamma_3\gamma_2\gamma_3^{-1})$
- 108: $(\gamma_2, \gamma_3\gamma_2^{-1}, \gamma_3\gamma_1\gamma_3^{-1})$
- 109: $(\gamma_1, \gamma_3\gamma_2^{-1}, \gamma_3\gamma_2\gamma_3^{-1})$
- 110: $(\gamma_2, \gamma_3\gamma_2, \gamma_3\gamma_1\gamma_3^{-1})$
- 111: $(\gamma_2, \gamma_1\gamma_3, \gamma_1\gamma_3\gamma_1^{-1})$
- 112: $(\gamma_2, \gamma_3\gamma_1^{-1}, \gamma_1\gamma_3\gamma_1^{-1})$
- 113: $(\gamma_3, \gamma_3\gamma_1^{-1}, \gamma_1\gamma_2\gamma_1^{-1})$
- 114: $(\gamma_3, \gamma_1\gamma_3, \gamma_1\gamma_2\gamma_1^{-1})$
- 115: $(\gamma_2, \gamma_3\gamma_1, \gamma_3\gamma_1\gamma_3^{-1})$
- 116: $(\gamma_1, \gamma_3\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_2\gamma_3^{-1})$
- 117: $(\gamma_2, \gamma_3\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_1\gamma_3^{-1})$

- 118: ($\gamma_1, \gamma_3\gamma_1, \gamma_3\gamma_2\gamma_3^{-1}$)
 119: ($\gamma_3, \gamma_1\gamma_2, \gamma_1\gamma_2\gamma_1^{-1}$)
 120: ($\gamma_3, \gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_1\gamma_2\gamma_1^{-1}$)
 121: ($\gamma_2, \gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_1\gamma_3\gamma_1^{-1}$)
 122: ($\gamma_2, \gamma_1\gamma_2, \gamma_1\gamma_3\gamma_1^{-1}$)
 123: ($\gamma_3, \gamma_2\gamma_1, \gamma_2\gamma_1\gamma_2^{-1}$)
 124: ($\gamma_1, \gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_2\gamma_3\gamma_2^{-1}$)
 125: ($\gamma_3, \gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_2\gamma_1\gamma_2^{-1}$)
 126: ($\gamma_1, \gamma_2\gamma_1, \gamma_2\gamma_3\gamma_2^{-1}$)
 127: ($\gamma_1, \gamma_3\gamma_2\gamma_1, \gamma_3\gamma_2\gamma_3^{-1}$)
 128: ($\gamma_2, \gamma_3\gamma_1\gamma_3^{-1}, \gamma_3\gamma_1^{-1}\gamma_2^{-1}$)
 129: ($\gamma_1, \gamma_3\gamma_2\gamma_3^{-1}, \gamma_3\gamma_2^{-1}\gamma_1$)
 130: ($\gamma_2, \gamma_3\gamma_1\gamma_3^{-1}, \gamma_3\gamma_1^{-1}\gamma_2$)
 131: ($\gamma_1, \gamma_3\gamma_2, \gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_2\gamma_3^{-1}$)
 132: ($\gamma_2, \gamma_3\gamma_1\gamma_2^{-1}, \gamma_3\gamma_1\gamma_3^{-1}$)
 133: ($\gamma_1, \gamma_3\gamma_2\gamma_3^{-1}, \gamma_3\gamma_2^{-1}\gamma_1^{-1}$)
 134: ($\gamma_2, \gamma_3\gamma_1\gamma_2, \gamma_3\gamma_1\gamma_3^{-1}$)
 135: ($\gamma_1, \gamma_2\gamma_3\gamma_1, \gamma_2\gamma_3\gamma_2^{-1}$)
 136: ($\gamma_1, \gamma_2\gamma_3\gamma_2^{-1}, \gamma_2\gamma_3^{-1}\gamma_1$)
 137: ($\gamma_3, \gamma_2\gamma_1\gamma_2^{-1}, \gamma_3\gamma_1\gamma_2^{-1}$)
 138: ($\gamma_3, \gamma_2\gamma_1\gamma_2^{-1}, \gamma_2\gamma_1^{-1}\gamma_3$)
 139: ($\gamma_1, \gamma_2\gamma_3\gamma_1^{-1}, \gamma_2\gamma_3\gamma_2^{-1}$)
 140: ($\gamma_1, \gamma_2\gamma_3\gamma_2^{-1}, \gamma_2\gamma_3^{-1}\gamma_1^{-1}$)
 141: ($\gamma_3, \gamma_2\gamma_1\gamma_2^{-1}, \gamma_3\gamma_1^{-1}\gamma_2^{-1}$)
 142: ($\gamma_3, \gamma_2\gamma_1\gamma_3, \gamma_2\gamma_1\gamma_2^{-1}$)
 143: ($\gamma_2, \gamma_1\gamma_3\gamma_2, \gamma_1\gamma_3\gamma_1^{-1}$)
 144: ($\gamma_2, \gamma_1\gamma_3\gamma_1^{-1}, \gamma_1\gamma_3^{-1}\gamma_2$)
 145: ($\gamma_2, \gamma_1\gamma_3\gamma_1^{-1}, \gamma_2\gamma_3^{-1}\gamma_1^{-1}$)
 146: ($\gamma_2, \gamma_1\gamma_3\gamma_1^{-1}, \gamma_2\gamma_3\gamma_1^{-1}$)
 147: ($\gamma_3, \gamma_1\gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_2\gamma_1^{-1}$)
 148: ($\gamma_3, \gamma_1\gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_1\gamma_2^{-1}\gamma_3$)
 149: ($\gamma_3, \gamma_1\gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_2^{-1}\gamma_1^{-1}$)
 150: ($\gamma_3, \gamma_1\gamma_2\gamma_3, \gamma_1\gamma_2\gamma_1^{-1}$)
 151: ($\gamma_2\gamma_1, \gamma_2\gamma_3, \gamma_2\gamma_3\gamma_1$)
 152: ($\gamma_2\gamma_1, \gamma_3\gamma_2^{-1}, \gamma_2\gamma_3^{-1}\gamma_1$)
 153: ($\gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_2^{-1}, \gamma_3\gamma_1\gamma_2^{-1}$)
 154: ($\gamma_2\gamma_3, \gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_2\gamma_1^{-1}\gamma_3$)
 155: ($\gamma_2\gamma_3, \gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_2\gamma_3\gamma_1^{-1}$)
 156: ($\gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_2^{-1}, \gamma_2\gamma_3^{-1}\gamma_1^{-1}$)
 157: ($\gamma_2\gamma_1, \gamma_3\gamma_2^{-1}, \gamma_3\gamma_1^{-1}\gamma_2^{-1}$)
 158: ($\gamma_2\gamma_1, \gamma_2\gamma_3, \gamma_2\gamma_1\gamma_3$)
 159: ($\gamma_3\gamma_1, \gamma_3\gamma_2, \gamma_3\gamma_2\gamma_1$)
 160: ($\gamma_3\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_2^{-1}, \gamma_3\gamma_1^{-1}\gamma_2^{-1}$)
 161: ($\gamma_3\gamma_1, \gamma_3\gamma_2^{-1}, \gamma_3\gamma_2^{-1}\gamma_1$)
 162: ($\gamma_3\gamma_2, \gamma_3\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_1^{-1}\gamma_2$)
 163: ($\gamma_3\gamma_2, \gamma_3\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_2\gamma_1^{-1}$)
 164: ($\gamma_3\gamma_1, \gamma_3\gamma_2^{-1}, \gamma_3\gamma_1\gamma_2^{-1}$)
 165: ($\gamma_3\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_2^{-1}, \gamma_3\gamma_2^{-1}\gamma_1^{-1}$)
 166: ($\gamma_3\gamma_1, \gamma_3\gamma_2, \gamma_3\gamma_1\gamma_2$)
 167: ($\gamma_1\gamma_2, \gamma_1\gamma_3, \gamma_1\gamma_3\gamma_2$)
 168: ($\gamma_1\gamma_2, \gamma_3\gamma_1^{-1}, \gamma_1\gamma_3^{-1}\gamma_2$)
 169: ($\gamma_1\gamma_3, \gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_2\gamma_3^{-1}\gamma_1^{-1}$)
 170: ($\gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_1^{-1}, \gamma_2\gamma_3\gamma_1^{-1}$)
 171: ($\gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_2\gamma_1^{-1}$)
 172: ($\gamma_1\gamma_3, \gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_1\gamma_2^{-1}\gamma_3$)
 173: ($\gamma_1\gamma_2, \gamma_3\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_2^{-1}\gamma_1^{-1}$)
 174: ($\gamma_1\gamma_2, \gamma_1\gamma_3, \gamma_1\gamma_2\gamma_3$)
 175: ($\gamma_1, \gamma_1\gamma_2, \gamma_1\gamma_3$)
 176: ($\gamma_1, \gamma_1\gamma_2, \gamma_3\gamma_1^{-1}$)
 177: ($\gamma_1, \gamma_1\gamma_3, \gamma_2\gamma_1^{-1}$)
 178: ($\gamma_1, \gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_1^{-1}$)
 179: ($\gamma_2, \gamma_2\gamma_1, \gamma_2\gamma_3$)
 180: ($\gamma_2, \gamma_2\gamma_1, \gamma_3\gamma_2^{-1}$)
 181: ($\gamma_2, \gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_2^{-1}$)
 182: ($\gamma_2, \gamma_2\gamma_3, \gamma_2\gamma_1^{-1}$)
 183: ($\gamma_3, \gamma_3\gamma_1, \gamma_3\gamma_2$)
 184: ($\gamma_3, \gamma_3\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_2^{-1}$)
 185: ($\gamma_3, \gamma_3\gamma_1, \gamma_3\gamma_2^{-1}$)
 186: ($\gamma_3, \gamma_3\gamma_2, \gamma_3\gamma_1^{-1}$)
 187: ($\gamma_1, \gamma_3\gamma_1, \gamma_3\gamma_2$)
 188: ($\gamma_1, \gamma_1^{-1}\gamma_3, \gamma_2^{-1}\gamma_3$)
 189: ($\gamma_1, \gamma_3\gamma_1, \gamma_3\gamma_2^{-1}$)
 190: ($\gamma_1, \gamma_2\gamma_3, \gamma_1^{-1}\gamma_3$)
 191: ($\gamma_1, \gamma_3\gamma_2, \gamma_3\gamma_1^{-1}$)
 192: ($\gamma_1, \gamma_1\gamma_3, \gamma_2^{-1}\gamma_3$)
 193: ($\gamma_1, \gamma_3\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_2^{-1}$)
 194: ($\gamma_1, \gamma_1\gamma_3, \gamma_2\gamma_3$)
 195: ($\gamma_1, \gamma_2\gamma_1, \gamma_2\gamma_3$)
 196: ($\gamma_1, \gamma_2\gamma_1, \gamma_3\gamma_2^{-1}$)
 197: ($\gamma_1, \gamma_1^{-1}\gamma_2, \gamma_2^{-1}\gamma_3$)
 198: ($\gamma_1, \gamma_3\gamma_2, \gamma_1^{-1}\gamma_2$)
 199: ($\gamma_1, \gamma_2\gamma_3, \gamma_2\gamma_1^{-1}$)
 200: ($\gamma_1, \gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_2^{-1}$)
 201: ($\gamma_1, \gamma_1\gamma_2, \gamma_2^{-1}\gamma_3$)
 202: ($\gamma_1, \gamma_1\gamma_2, \gamma_3\gamma_2$)
 203: ($\gamma_2, \gamma_3\gamma_1, \gamma_3\gamma_2$)
 204: ($\gamma_2, \gamma_1^{-1}\gamma_3, \gamma_2^{-1}\gamma_3$)
 205: ($\gamma_2, \gamma_3\gamma_1, \gamma_3\gamma_2^{-1}$)
 206: ($\gamma_2, \gamma_2\gamma_3, \gamma_1^{-1}\gamma_3$)
 207: ($\gamma_2, \gamma_3\gamma_2, \gamma_3\gamma_1^{-1}$)
 208: ($\gamma_2, \gamma_1\gamma_3, \gamma_2^{-1}\gamma_3$)
 209: ($\gamma_2, \gamma_3\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_2^{-1}$)
 210: ($\gamma_2, \gamma_1\gamma_3, \gamma_2\gamma_3$)
 211: ($\gamma_2, \gamma_1\gamma_2, \gamma_1\gamma_3$)
 212: ($\gamma_2, \gamma_1\gamma_2, \gamma_3\gamma_1^{-1}$)
 213: ($\gamma_2, \gamma_1\gamma_3, \gamma_2\gamma_1^{-1}$)
 214: ($\gamma_2, \gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_1^{-1}$)
 215: ($\gamma_2, \gamma_1^{-1}\gamma_2, \gamma_1^{-1}\gamma_3$)
 216: ($\gamma_2, \gamma_3\gamma_1, \gamma_1^{-1}\gamma_2$)
 217: ($\gamma_2, \gamma_2\gamma_1, \gamma_1^{-1}\gamma_3$)
 218: ($\gamma_2, \gamma_2\gamma_1, \gamma_3\gamma_1$)
 219: ($\gamma_3, \gamma_2\gamma_1, \gamma_2\gamma_3$)
 220: ($\gamma_3, \gamma_2\gamma_1, \gamma_3\gamma_2^{-1}$)
 221: ($\gamma_3, \gamma_1^{-1}\gamma_2, \gamma_2^{-1}\gamma_3$)
 222: ($\gamma_3, \gamma_3\gamma_2, \gamma_1^{-1}\gamma_2$)
 223: ($\gamma_3, \gamma_2\gamma_3, \gamma_2\gamma_1^{-1}$)
 224: ($\gamma_3, \gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_2^{-1}$)
 225: ($\gamma_3, \gamma_1\gamma_2, \gamma_2^{-1}\gamma_3$)
 226: ($\gamma_3, \gamma_1\gamma_2, \gamma_3\gamma_2$)
 227: ($\gamma_3, \gamma_1\gamma_2, \gamma_1\gamma_3$)
 228: ($\gamma_3, \gamma_1\gamma_2, \gamma_3\gamma_1^{-1}$)
 229: ($\gamma_3, \gamma_1\gamma_3, \gamma_2\gamma_1^{-1}$)
 230: ($\gamma_3, \gamma_2\gamma_1^{-1}, \gamma_3\gamma_1^{-1}$)
 231: ($\gamma_3, \gamma_1^{-1}\gamma_2, \gamma_1^{-1}\gamma_3$)
 232: ($\gamma_3, \gamma_3\gamma_1, \gamma_1^{-1}\gamma_2$)
 233: ($\gamma_3, \gamma_2\gamma_1, \gamma_1^{-1}\gamma_3$)
 234: ($\gamma_3, \gamma_2\gamma_1, \gamma_3\gamma_1$)

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]


[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Stellt man das Schnittverhalten in einer Graphik dar, in der jeweils für den Fall des Schnittes ein Punkt steht, erhält man folgendes Bild:



Die entstehenden Muster haben immer eine Größe von acht oder vier Punkten. Das liegt daran, daß bei der Erzeugung aller Basen zu einer festen Basis zunächst alle Basen betrachtet werden, die sich durch Invertieren der Basis-elemente von σ ergeben. Die Größe vier entsteht dadurch, daß von diesen acht entstehenden Basen noch je zwei zur gleichen Komponente gehören können.

Literatur

- [CV] Marc Culler, Karen Vogtmann: *Moduli of graphs and automorphisms of free groups* , **Inventiones mathematicae** 84(1986), 91–119.
- [G] Jürgen Grosche: *Über die Fundamentalgruppe von Quotientenräumen Siegelscher Modulgruppen* , **Journal für reine und angewandte Mathematik** 281(1976), 53–79.
- [GH] Lothar Gerritzen, Frank Herrlich: *The extended Schottky space* , **Journal für reine und angewandte Mathematik** 389(1988), 190–208.
- [GHP] Lothar Gerritzen, Frank Herrlich, Marius van der Put: *Stable n -pointed trees of projective lines* , **Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen** 91(1988), 131–163.
- [H] A. H. M. Hoare: *On length functions and Nielsen methods in free groups* , **Journal of the London Mathematical Society** 14(1976) (Series 2), 188–192.
- [HK] Holger Heidrich, Friedrich Knöller: *Über die Fundamentalgruppen Siegelscher Modulvarietäten vom Grade 2* , **manuscripta mathematicae** 57(1987), 249–262.
- [K] Egbert van Kampen: *The fundamental groups of some related spaces* , **American Journal of Mathematics** 55(1933), 261–267.
- [P] Meinolf Piwek: *The formal Teichmüller space*, **preprint**.
- [S] Jean-Pierre Serre: *Trees*, Springer New York Heidelberg Berlin, 1980.

Lebenslauf

- 29.2.64 geboren in Menden(Sauerland)
- 1970–1974 Besuch der Bodelschwingh-Grundschule in Menden
- 1974–1983 Besuch des Walramgymnasiums in Menden
- 18.6.1983 Abitur
- 1983–1987 Studium der Mathematik in Bochum
- 13.10.1987 Abschluß des Studiums
- 15.10.1987 Einstellung als wissenschaftliche Hilfskraft am
Mathematischen Institut der Universität Bochum

